



吉慶堂

卷一

本第一冊

半
新集山氣齋

重訂寶圖

國中史部經史子部

工部
二部
書

女科第一善本

閩中武林鄉先生著

仁記鵠
工校刻

重訂濟陰綱目

上
洋埽葉山房藏板

BGA 276
V.1

濟陰綱目序

大醫者活人之事而亦殺人之機也今天下
醫書亦繁夥矣未盡其變紙上陳言何足為
用設沉疴當前醫士環視生之乎殺之乎曰
殺之也何以明其然也拘泥古方以療今疾
如此者醫殺之耳男子無論矣女子之情隱
微難見病不自知而一委於醫醫又不能得
其隱微望聞問無有焉一憑於脈脉其可盡

憑乎惟是妄意揣度聊復從事焉嗟乎此何等事而竟以意度之想當然乎哉然隱微亦難言矣從其隱而隱之則無乎不隱如倉公之診女子知其思欲不遂脈出魚際一寸是也從其顯而顯之則無乎不顯如婦人因夫不歸而發狂疾哭泣無時詬詈無度醫者迎而奪之拔劍砍之彼則匍伏不敢仰視久之愈矣是也岳武穆云運用之妙存乎一心兵

法也亦醫法也吾因是而又知天一生水之

法也亦醫法也吾因是而又知天一生水之
義矣水能生人亦能殺人故禹之治水也窮
其源而疏之因其勢而利導之自無汎濫之
患禹非能治水也因水以治水也人能知禹
之治水則知所以治婦女之科也故濟陰綱
目一書其立論自調經始有綱領有原委有
條貫有分疏一病之中三致意焉一方之設
細詳釋焉得其隱微能盡其變使人閱之一

團生氣浮於紙上詎非活人之書哉雖曰濟
陰實以扶陽也無陽則陰無以生無陰則陽
無以化陽施陰化而醫道之能事畢矣吾非
能知醫也而因醫以知醫故重為訂之以廣
仁人之心而已雖然喻指為月指終非月讀
者因指識月焉可也

雍正戊申年孟冬月西陵憺漪子汪淇右子

甫題於孝友堂別業

濟陰綱目凡例

一凡醫家治男子易治婦人難所以丹溪云寧治十男子不治一婦人甚言女科之難也惟茲濟陰綱目一書集百家之精華彙諸書之奧旨真千古之秘義功參大化一時之鴻寶福庇坤元也

一是書理解微妙無不條分節判標榜詳明卽一圈一點俱出匠心令人一見了然至于上層批評箋釋各從本末源流分疏辯覈學者開卷既易于尋方病者得醫無

難于對症矣。

一。是編雖屬婦人。而刻其論脉。理經絡處。俱採內經素問之精微。如某症加減某藥等。不僅女科要書。即大小諸家。細爲觀覽。咸可觸類旁通。所謂造化在手。物類聽其鑪錘橐籥在心。乾坤亦任其旋轉耳。

一。婦人得病。種種與男子不同。其所由起。世人畧而不知。此書獨先明其病源。因何而啟。然後論脉論症。中引古方之的確。而增減其藥味。土批議論之可否。而商量其

去從此因病用藥。按脉切理。不拘于方之內也。神而明

去從此因病用藥。按脉切理。不拘于方之內也。神而明之。存乎其人。

一集內凡藥味之炮製煎熬之合法。加減之精當。各以類推。種種不同。初入門者。宜細心翫習。卽四解醫宗窮究厥中與理。則其學自居聖功之上。而盧扁再出矣。

一是書實醫家之秘寶。因原板無存。世人每欲購求遺本。真如丹經仙錄。可思而不可得。今本坊重登梨棗。照原本。不易一字。至于紙用精良。鐫皆名手。以方可壽人書。

可壽世述者不厭精工。識者自爲鑒賞。

一。此。刻。之。後。隨。有。慈。幼。綱。目。卽。證。治。準。繩。之。幼。科。也。復。增。
圈。點。詳。加。評。釋。亦。如。是。編。之。精。詳。梓。以。問。世。蓋。濟。陰。所。
以。扶。陽。地。天。于。焉。常。泰。而。慈。幼。卽。以。康。老。運。會。用。是。咸。
亨。不。佞。壯。志。旣。頽。致。藉。仁。術。以。傳。婆。心。熱。腸。未。冷。願。持。
垣。方。下。問。國。手。倘。不。棄。於。梁。公。之。藥。籠。或。有。補。天。黃。帝。
之。赭。鞭。也。

康熙四年一陽月西陵愴漪子汪 洪右子父題于蜩寄

訂濟陰綱目目錄

卷之一

調經

論經王衝任二脉

論心脾爲經血主統

論脾胃生血

論經不調由風邪客於胞中

論三月一來爲居經

論師尼寡婦異乎妻妾之治

論調經當抑氣

論調經先去病

論調經大法

論經水異色

論經候愆期

論月水多少

論月水不利

論月水不斷

論過期不止

論經病疼痛

論經病發熱

論往來寒熱

論熱八血室

論行經泄瀉

脉法

調經通用諸方

四物湯

治婦人衝任虛損月水前後不調或
胎前產後一切等症

簡易當歸散

治經脉不勻不行或
腰腿疼痛增損四物湯治月事不調
心腹疼痛

大溫經湯

治月候或來多或過期
或崩或瘀小腹急痛

嚴氏抑氣散

治氣盛於血
頭暈胸滿

四製香附丸

治婦女經
候不調

十味香附丸

治經候
不調

九味香附丸

治婦人
百病

艾附暖宮丸

治經不調小腹時痛
赤白帶下子宮寒冷

百子歸附丸

調經種
子安胎

人參養血丸

治女稟弱氣血
虛損常服調經

當歸地黃丸

治血氣不和月事
不勻腰腿疼痛

治經候先期方

先期湯

先期而來宜
涼血固經

金匱土瓜根散

治帶下經不利小
腹滿痛一月再來

治經候過期方

治血易治心虛

治經候過期方

過期飲過期不行宜補血行氣

滋血湯治心肺虛損月水過期

治經水過多方

當歸飲助陽助陰治月水過多無他證者

膠艾湯治勞傷氣血月水過多淋瀝不止又能安胎

丹溪方治稟弱氣不能攝血經水來多

治經水澁少方

七沸湯治經水愆期或多或少少腹痛

四物加葵花湯治經水澁少

四物加熟地黃當歸湯治水少而色和

治月水不利方

牛膝散治月水不利臍腹引腰痛氣攻胸膈

牡丹散治月水不利臍腹疼痛不欲食

養榮湯治血虛恍惚驚悸發熱經候不利

玄歸散治月經壅滯臍腹疼痛

歸漆丸治月水不利臍下逆氣腹滿

治月水不斷方

止經湯

治困倦多睡少食經水淋漓或后或赤白黃水面青黃頭眩目花四肢酸

蒲黃散

治經水不止

固經丸

治月水過多不止陰虛挾熱所致

治過期不止方

芩心丸

治四十九歲後天癸行而不止

補中芎藭湯

治月水不調崩中暴下或產後失血過多腹痛或胎動下血

茸附湯

補衝任血

治經病疼痛方

越痛散

治血氣虛寒身體作痛

八物湯

治經將行臍腹痛者氣滯血濕也

加味四物湯

治經來作疼不止

烏藥湯

治血海疼痛

加味烏藥湯

治經水欲來臍腹疼痛

澹寮著附丸

治經不調血氣刺痛腹脇膨脹

薑黃散

治血凝滯臍腹刺痛

琥珀散

治經帶心腹臍痛不可忍及產後惡露不快血上搶心迷悶不省欲死

玄胡索散

治血氣攻刺新舊腹痛

當歸散

治久積血氣病痛小便刺痛四肢無力

經驗方

治臍痛不省人事一服立止

三神丸

治室女血氣相搏腹痛引心跳經澀少不調

交加散

治經脈不調腹痛瘕聚及產後中風

交加散

治月車湛濁逐瘀血中臍腹撮痛腰腿重墜

交加地黃丸

治經不調血塊脹痞肚腹疼痛

瓦龍丸

治瘀血作痛

桂枝桃仁湯

治經前感寒腹痛難忍

柴胡丁香湯

治三十歲臨經頓先腰臍腹痛經縮二三日

小溫經湯

治經不調臍令痛

沒藥除痛散

逐寒邪腹痛

治經病發熱方

逍遙散

治血虛煩熱口燥咽乾減食嗜臥月水不調痰嗽朝熱體瘦骨蒸

加味四物湯

治月水不行發熱如瘵

六神湯

治血氣不足煩熱體倦不進飲食

治往來寒熱方

本事方

治血脈不調往來寒熱狀如勞倦

地骨皮散

治血氣兩虛寒熱肺熱內熱

柴胡散

治寒熱體瘦肢節疼痛口渴心煩少食

七寶湯

治寒熱往來

柴胡四物湯

治虛勞日久
微有寒熱

柴胡抑肝湯

治寡居獨陰無陽欲心
萌而不遂寒熱如結

生地黄丸

治師尼寡婦
寒熱如瘧

治熱入血室方

小柴胡加地黃湯

治中風發熱惡寒經水適
來青明了夜譫語如見鬼

乾薑柴胡湯

治婦人傷寒經脈方來熱入
血室寒熱如瘧狂言見鬼

牛黃膏

治熱入血室發狂不認人

海蛤散

治婦人傷寒
血結胸膈

卷之二

經閉門

論經閉由二陽之病治宜瀉心火養脾血

論經閉不行有三治宜補血瀉火

論經閉因肝勞血傷

論經閉因勞傷當大補脾胃

論室女經閉成勞因思慮傷心

論經閉因積冷結氣

論經閉因痰飲所隔

論下利經閉利止經來

論經閉總由血滯血枯

論下利經閉利止經來

論經閉總由血滯血枯

論經閉大法

脉法

治血枯經閉方

玉燭散

治胃熱善食津液燥竭以致血枯四物合調胃平氣湯

三和散

治勞心火旺月事不來四物合涼膈散

二黃散

治婦女經脈不通如神

二氣丸

治月經不調斷產黃瘦不喜飲食燥熱

五補丸

補諸虛安五臟堅骨養精

衛生湯

補氣血

栢子仁丸

治血虛有火經閉不通日瘦潮熱並室女思慮經閉

澤蘭湯

治症同前

加味補中益氣湯

治飲食少血不生脾食少血不傷

十全大補湯

治墮胎多產傷血或服就伐之藥以致血衰氣少下行

養真湯

治經閉臍不有塊

治血澁經閉方

溫經湯

治經道不行臍寒痛脉沉緊

桂枝桃仁湯

治症同前

紅花當歸散

治婦人室女經不行瘀積腰腹痛

行經紅花湯

治婦女經阻脹痛

凌霄花散 治月水不行發熱腹痛

土牛膝散 治婦女血閉煩熱

琥珀散 治心膈氣悶腹痛月信不通

萬病丸 治經阻絞痛

產寶方 治月經不通腹中痛

和血通經丸 治經疑不行腰背腹痛

大黃膏 治乾血氣

通經丸 治月候不通或成血痕

治痰結經閉方

丹溪方 治積痰傷經不

加味導痰湯 治經閉

磐石丸 治經閉臍堅結痕中有乾血下自物

瑞金散 治血氣撮痛經不行

當歸散 治血不通

桃奴飲子 治經閉脹滿及墜馬跌

通經丸 治經閉血塊疼痛

千金桃仁煎 治血積癥瘕

斑猫通經丸 治經閉及乾血氣

聖惠方 治月水澀滯不快結成瘕塊脹大欲死

一方 治形實氣盛月水不通屢驗

掌中金丸 治乾血氣

一粒仙丹

通經下取方

血崩門

論崩中由傷損衝任

論血崩因虛熱

論氣陷血脫法當升舉

論血瘀腹痛法當收止

論過服寒涼法當溫補

論補中去積

論開痰行氣

論殺血心痛

論崩漏雜治

經驗簡要治崩中等證法

脉法

治血熱崩漏方

荊芥四物湯

治崩漏初起不問虛實服之立止

奇效四物湯

治肝熱血沸久而不止

河間生地黃散

治經漏紫黑脉虛洪者

涼血地黃湯

治腎水陰虛不能鎮守相火血崩者

小蘇湯

治崩色如水得溫則煩悶此陽傷陰而下血脉數小順大者逆

芩薊酒

治崩中晝夜不止

治崩中去血不止

一方治崩

金華散治血虛有熱崩不止

簡易黃芩湯治陽乘陰崩中不止

治勞傷崩漏方

膠艾四物湯治勞傷月水過多不止及胎前不安漏血傷胎

當歸芍藥湯治經漏鮮紅因勞倦脾虛氣短自汗身熱惡食倦怠泄瀉

歸脾湯治思慮傷脾不能持血以致妄行或健忘驚悸不寐或心脾傷痛倦怠不食

栢子仁湯治憂思過度心傷不能藏血下血不止養血平肝湯治大怒經血暴下

治崩漏氣陷方

益胃升陽湯治血脫益氣先補胃以助生長諸甘藥為先陽生陰長甘能生血也

柴胡調經湯治鮮血不止項急腦痛脊強不思食

調經升陽除濕湯治漏下惡血或不調不止多水漿等證見解多不錄

治崩漏血瘀昏暈疼痛等證方

五靈脂散

治血崩不止昏暈不省附入法

香附子散

治血崩五色不止併治產後小產腹痛血不止是婦人仙藥

煮附丸

治崩漏帶下積聚疔痛方見調經疼痛門

備金散

治血崩不止

如神散

治血崩赤白帶下

立效散

治血崩臍腹下痛

一方

同前

縮砂散

治血崩

加減四物湯

治天癸至或後至卒暴淋瀝不止若崩者或過多變生諸症者悉宜

治崩漏虛寒方

丁香膠艾湯

治心氣不足飲食不節崩漏不止尺脈弦緊而洪按之無力者

芎藭湯

治風寒冷熱勞損衝任月水不調崩中暴下腰重裏急虛羸腹痛及胎動

斷下湯

治衝任氣虛崩漏不調每月候將來臍腹腰脚先痛食減乏力

加味四物湯

治崩漏

熟附丸

溫澁之劑

鹿茸丸

治經候過多其色黑呼吸少氣
臍腹冷極汗出如雨尺脉微小者

治崩漏虛脫方

大千方

治崩下不止小腹痛

栢黃散

治經血不止
涼澁之劑

又方

治崩中不止結血
片如雞肝碎爛

伏龍肝散

治勞傷衝任急崩如豆汁血片五色赤
白相雜腰腹冷痛黃瘦口乾食減無力

地榆散

治崩中不止

蒲黃散

同上

震靈散

治妄行

鹿茸散

治崩漏不止
虛羸瘦損

補宮丸

治諸虛久不妊娠骨
熱形羸崩中帶下

牡礪丸

治月水不止
衆藥不愈

一方

大千方名無
比散無阿膠

血見黑則止方

以下諸方品味錯雜然總是治久崩止
瀉之藥今各有參識觀者亦可省心

五灰散

十灰散

如聖散

當歸散

一方 治血崩
屢效

立應散

琥珀散 一名易
紗帽散

立效散

必效散

烏金散

香礬散

一方

止崩雜方 共二十
五方

千金方 治婦人無
故尿血

孫真方 治九竅
出血

卷之三

赤白帶下門

論帶下田勞傷衝任

論帶下五色因風邪入於胞門

論帶下屬濕熱冤結不散

論帶下痰實宜吐下

論帶下虛寒宜溫補

論帶久枯涸宜潤補

治帶下當以壯脾胃升陽氣為主

論帶久不止當補衛厚脾

論帶下濕熱藥用正治從治之異

論帶下雜治法

論室女帶下

排膿

消瘀血

論白濁白淫

脉法

治濕熱帶下

清白散

治白帶加減法有

解帶散

治濕熱白帶痰鬱嘈雜倦怠煩熱

檮皮丸

治赤白帶山濕熱者

勝濕丸

治濕熱勝赤白帶

蒼朮檮皮丸

治帶下

側柏檮皮丸

治七情白帶脉數

苦練丸

治赤白帶甚妙有加減

四神丸

治帶下

萬安散

治赤白帶或如脂或臭濁

大聖萬安散

治癥瘕癖氣腹脹胸滿赤白帶下虛弱痿痺休息痢並效

宣明導水丸

治濕熱鬱於下焦赤白帶燥熱煩渴

治濕痰帶下方

治濕熱消痰飲下

治濕熱消痰飲下

治濕熱痰積

治濕熱痰積

肥人白

帶是濕

小胃丹

上取胸膈痰下取腸胃痰並治濕熱痰結白帶

補藥方

治痰結白帶與前方並用

治風邪帶下方

胃風丹

治風邪入胞中經傳臟帶下五色

小柴胡湯

治風邪帶下五色有加法有加減法

蒼柏參茸散

治上有頭風下有白帶

地榆散

治漏下五色十二帶治嘔吐下血

治虛損帶下方

衛生湯

治帶下肝微弱腹痛

補中益氣湯

治飲食勞倦脾胃氣弱白帶不止

六君子湯

治胃虛有痰食必時時帶下

加味八珍湯

治氣血兩虛赤白帶下有加減

歸脾湯

治思慮過傷心脾致健忘怔忡不寐怠惰嗜以不思飲食白帶不止

當歸澤蘭湯

治經脈不調赤白帶下無子者

止帶丸

補氣血溫下元清濕熱有加減法

嚴氏當歸煎

治赤白帶下腹內疼痛不欲食

荳蔻丸

治赤白帶不熱不寒助陰生子

補宮丸

治諸虛久不妊娠骨熱形瘦崩中帶下

丹溪方

白帶真陰虛者

千金方

治帶下脉數陰虛有熱

補真固經丸

治白帶流而不止心炮火脉極微諸藥不效有醫案

助陽湯

治白帶陰中痛控心而痛身黃皮緩身重如山陰中如水

治虛寒帶下方

元戎四物湯

治赤白帶脉沉微腹痛陰中痛

玉仙散

治赤白帶

延胡苦練湯

治臍下冷撮痛陰冷白帶

桂附湯

治白帶腥臭多悲不樂大寒有加減

當歸附子湯

治臍下冷痛赤白帶下

暖宮妙應丸

治赤白帶子宮冷無子者

酒煮當歸丸

治癰疽白帶長流不禁腰以下如水火坑厚衣猶冷小便不止

鶴頂丸

治未嫁女經下受冷有嫁之婦陰遇風冷乘人產後帶下亡血傷胞

白藪丸

治室女虛寒帶下純白

神仙聚寶丹

治血海虛寒風冷搏結積塊癖腹脇疼小便急赤白崩漏

茱萸浴湯

治下焦虛冷臍腹疼痛帶下五色月水淋漓不斂

坐藥龍鹽膏

治帶下

勝陰丹

治同前方

回陽丹

勝陰丹治同
五色月水淋漓不
回陽丹

如聖丹
治經脈不調
赤白帶下

治帶下滑脫

側柏地榆湯
治赤白帶下
不能成孕

白芷散
治赤白
帶下

伏龍肝散
治赤白帶久不產
胎

馬蹄丸
治白漏
不絕

固真丸
治白帶大下不止
如水中亦然
目溜火齒惡熱

一方
治赤白帶下不
問遠年近日

茅花散
治血崩不止
赤白帶下

雙白丸
治白帶
如神

白附丸
治經年崩漏不止
諸藥不效
脈濡微

地榆膏
治赤白帶
下骨立者

治白濁白淫

加味四七湯
治婦女小便不
順陰戶疼痛

鎖精丸
治白濁白
帶淋漓

固精丸
治下虛胞寒白濁如
凝脂或小便無度腰重

內金鹿茸丸
治勞傷血脈絡受寒
小便白濁日夜無度

金鎖正元丹
治真氣不足吸短氣
軟日暗耳鳴遺精盜汗
白濁

威喜丸
治丈夫陽虛精氣不固
泄婦人白帶白濁白淫
下部常溫

烏金散

治身熱口燥氣喘築痛下黃水如葵汁

一方

治虛寒白濁滑數不禁

卷之四

虛勞

論婦女虛勞與男子不同

論初病大法

論無熱虛勞

論有熱虛勞

論察骨蒸熱

論血風勞

治虛勞平補諸方

增損四物湯

治氣血不足四肢怠倦少氣及產後下血過多榮衛虛損仁寒仁熱

六神湯

治脾氣不和榮衛不足怠倦困倦不嗜飲食

聖愈湯

治血虛心煩睡臥不寧

加減大建中湯

治胎產虛損月水不調腹痛寒熱自汗口乾

當歸建中湯

治一切血氣虛損

雙和散

治大病後虛勞乏力

八珍湯

治氣血兩虛

補中益氣湯

治形神勞倦飯食失節脾氣虛損下陷以致發熱頭痛心煩疲弱

補中益氣湯 治氣虛勞乏

歸脾湯 治脾經失血少寐建忘驚悸發熱盜汗不思飲食 黃耆散 治食後身倦盜汗

桔梗引子 治心氣不足 補肺湯 治勞嗽補熱盜汗自汗

劫勞散 治心腎俱虛嗽聲無痰夜熱盜汗倦

補中丸 治婦人虛損諸疾 人參丸 養陰生血補虛

七補丸 治血氣虛弱腹中經結狀若懷孕月候尚來

十補丸 治諸虛百損形瘦面黃寒熱口苦血崩帶下墮胎孕婦尤宜 羊乳丸 治虛勞羸瘦

滋陰百補丸 治勞傷血氣陰陽不和在寒在熱心腹疼痛不思飲食

六味丸 治腎經不足熱渴便閉痰嗽眩暈耳聾咽燥腰腿痠軟盜汗便血諸血天音

八味丸 治命門火衰不能生土脾胃虛弱便溺腹痛疼痛泄瀉等証

益陰腎氣丸 治腎水不足潮熱盜汗煩熱食少痰嗽胸痞便赤足熱

烏雞煎丸 治氣血虛勞赤白帶下 人參驚甲丸 治一切虛損咳嗽盜汗寒熱不思食

艾煎丸 治婦人諸虛 著味丸 補虛散

治無熱虛勞

附子理中湯

治真陽不足飲食難化
便泄腸鳴手足逆冷

黃耆建中湯

治諸虛不足
補益榮衛

加味黃耆湯

治陽虛
惡寒

十全大補湯

治冷
勞

渾身碎痛引子

治勞
倦

木香丸

治冷勞經脈不調臍腹
氣滯四肢疼痛食無味

戊巳丸

治新婦素稟虛寒滑
泄喫食嘔吐狀如翻胃

硃砂丸

治冷勞積聚腹脇
疼痛肢瘦不食

治有熱虛勞

逍遙散

治血虛煩熱肢瘦胃脘發熱盜汗
食減嗜臥月水不調漸成骨蒸

黃耆散

治勞熱四肢煩疼
躁渴羸瘦不欲食

子芩散

治涼心肺
除勞熱

知母散

治羸瘦壯熱四肢煩疼
咽喉不利不思飲食

半夏散

治熱勞煩渴口乾寒熱
痰道嘔吐不欲飲食

秦芫散

治經血有熱月脉
凝滯五心煩倦

蟹甲地黃湯

治手足煩熱怔忡
悶及血室有乾血

胡黃連散

治經脈不通四肢疼痛
煩渴不眠飲食全少

犀角散

治心胸煩熱
經脈凝滯

紅藍花散

治四肢羸瘦
經脈不通

蟹甲散

治勞熱發渴壯熱四肢煩
疼漸漸黃瘦心胸燥悶

紅藍花散 治勞嗽吐血發熱口湯盜汗

阿膠丸 治勞嗽吐血發熱口湯盜汗

猪肚丸 治熱勞

治骨蒸勞瘵

加味四物湯 治骨蒸

黃連散 治骨蒸勞熱四肢昏沉皆疼面黃無方

青蒿散 治骨蒸

柴胡散 治骨蒸勞瘵妨悶不欲食

河車丸 治勞嗽一切方瘵虛損骨蒸等

黃芩丸 治骨蒸煩渴不眠

地黃煎丸 解勞生肌活血養心

治傳尸勞

天靈蓋散 治傳尸骨蒸四肢無力至晚發熱煩紅煩躁

益母草丸 治骨蒸月候不通

獺肝丸 治骨蒸煩瘵不欲食

殺鬼方 治傳尸勞瘵鬼氣伏連

治血風勞方

人參荊芥散 治血風發熱体疼頭昏寒熱盜汗痰嗽胸

地骨皮 治血風体弱寒熱發渴

大效油煎散 治血風勞氣攻注四肢疼痛嘔逆醋心痠黃麻痺血海冷敗

萬金逍遙散

治血風勞煩躁怔
坤憂悵頭重盜汗

熟乾地黃丸

治冷氣攻心心腹
疼痛食少羸瘦

卷之五

積聚癥瘕

論婦人諸積形狀

瘕瘕疝瘕入
瘕瘕食瘕血

論八瘕所

黃青燥血
脂狐蛇

論癥痞

論食癥

論血癥

論腹中瘀血

論瘕瘕

瘕近臍左右一條筋急
瘕在兩肋時痛

論疝瘕

有案

論腸覃

乃寒客大腸覃延日久始如卵久如胎
按之堅推之移月事時不氣病血不病

論婦人癥瘕並屬血病

垂瘕
米瘕

龍腹
酒瘕

論治積須養正氣

有案

論痰積用吐下

有案

脉法

通治諸積方

開鬱正元散

治痰飲血氣鬱結食
積氣不升降脹痛

助氣丸

治三焦痞閉胸膈滿悶氣
結成積瘕瘕氣塊並治

大七氣湯

治積聚隨氣上下心腹疝痛上

勝紅丸

治脾積氣滿滿悶氣促嘔吐清水酒積血積食積

三稜煎

治婦人血瘕

香稜丸

治一切積痰癰塊

大硝石丸

治七瘕入瘕帶下絕產此藥去瘕瘕令人不困

阿魏膏

治一切瘕塊

分治八瘕方

皂莢散

治黃瘕導

療青瘕

坐導法

療燥瘕

療血瘕攻刺腹脇時痛

療血瘕瘕方

桃仁煎

治血瘕血積經候不通下如豆汗如雞肝蝦蟆衣狀有本事方宜

療胎瘕方

著男于陰頭

導散方

內陰中

療狐瘕方

服

療蛇瘕方

服

療鼈瘕方

服

治瘕瘕方

穿山甲散

治婦人廠痞惡血攻心腹

蓬莪茂散

治

丁香丸

治癥痞結塊不散心腹疼痛

桃仁散

治癥痞心腹脹滿不食無力

治食癥方

化積丸

治婦人死血食積痰飲塊在兩脇動作雷鳴嘔維眩暈寒熱時作時止

小三稜煎

治食癥酒癖血瘕氣塊時發刺痛不思食一切積滯不消

硃砂丸

治婦人食癥久不消令人瘦弱食少

礞石丸

治食痰火不消攻刺心腹疼痛

治血癥方

增味四物湯

治婦人血積遇寒觸痛不可忍

六合湯

治經事不行腹中結塊腰腿重痛

血竭散

治血瘕作痛脇下脹滿月經不行發熱體倦

牡丹散

治久虛血塊未注心腹疼痛

當歸丸

治月經不調血積證

大黃散

治血癥血瘕食積痰滯

大紅花丸

治血積癥瘕經絡滯滯

治腹中瘀血方

治腹中瘀血方

桃奴散

治血蠱瘀血停積經水不調男子跌撲傷損皆效

大黃湯

治血瘀不消及打撲傷損

琥珀散

治經緯宿塞瘀血痛不可忍

地榆散

治敗血

治瘕癖方

麝香丸

治痰癖冷氣症氣心腹痛不可忍

治婦人瘕癖氣血等神效

用貴猪肝

葱白散

治冷氣不和膀胱氣攻痛胎產腹痛血臍冷百節痛婦人一切疾病

烏雞煎丸

治胎前產後諸疾及脾疼浮腫並治有十八引有醫案

四等丸

治瘕癖心腹疼痛飲食不消

又方

髓甲大黃三稜

木香礪砂丸

治瘕癖血塊刺痛脾寒猪食不消久不瘥

治瘕瘕方

乾漆散

治瘕瘕久不消令人黃瘦兩脇妨悶心腹疼痛

當歸散

治瘕瘕攻刺心腹痛不可忍

礪砂丸

治症瘕瘀血在臟時攻腹脇疼痛

巴豆丸

治瘕瘕血氣疼痛

黑神丸

治腎氣膀胱瘕瘕墜五膈血崩產後諸血漏下赤白死胎難產

喻露丸

治傷寒於內氣凝不流結於腸外久為瘕瘕時作疼痛腰不得伸各賜單

烏喙丸

治腸覃亦治乳餘并男子疝氣

見睨丸

治寒客下焦血閉成瘕日以盜大狀如懷子名曰石痕

蘆薈丸

治疳瘕肌肉消瘦發熱潮熱食少口乾或肝疳口鼻生瘡牙齦蝕爛等症

卷之六

求子

論求子須知先天之氣

論求子脉須平和

論求子先調經

論求子貴養精血

論求子必知絪縕之時

論合男女必當其年

論男女精血盛衰

論成胎分男女之異

論男女各由百脉齊到

趕經法

逐月養胎法

論癸飲不孕

論求子禁用熱藥

論孕子雜法

脉法

治血虛不孕方

加味四物湯

久服有子

加味四物湯

治血氣兩虛不孕

調經種玉湯

治七情所傷致血衰氣盛經水不調或澹或紫或漏帶疼冷

經驗青胎丸

治久無子嗣服此經調血盛宮暖成孕

婦人歸附丸

不但種子且無小產產後諸症

神仙附益丸

不唯治婦人白病而生育之功如神

加味地黃丸

治久無孕育效如影響

金蓮種子仙方

女八服之有孕

百子建中湯

調經養血安胎順氣不問胎產月事參差悉宜

加味養榮丸

服之有孕且無小產之患

加味香附丸

女八服服聚精丸男

大五補丸

治瘦人無孕乃無血攝精故宜潤

增損三才丸

神效墨附丸

治久無子而經事不調及數墜胎者可立效

青蒿烏雞丸

服之能令多子

天烏雞丸

治血虛有熱崩瘦經不調骨蒸崩帶不能成胎

小烏雞丸

治婦人百病有二十六引

十全濟陰丸

養陰抑陽妙在河車因人加減初無定法計十二條

治宮冷不孕方

調生丸

一名說

治衝任虛寒胎孕不成或而多墮

調氣暖官丸

勝金丸

即女金丹

治產後失調經渥帶下腰重寒熱身發眩暈嘔逆一切雜症

白薇丸

治月木不利四肢羸瘦漸漸虛乏

白薇丸

治無子斷經上熱下冷百病服之踰年有子

秦桂丸

治血海久冷不能孕育

艾附丸

後各隨飲下

王子丸

此藥服之不過一月有孕試效

盪胞湯

治婦人全不產育及二三十年不孕者

南嶽魏夫人濟陰丹

治血海虛冷久無孕育及數墮胎一切不調崩漏

紫石英丸

治子宮久冷不孕及數墮胎月候不勻崩漏微瘕白淫白帶

坐導藥

治婦人全不產及斷續服前盪胞湯惡物不盡用此方

內藥續生丸

同前

治痰塞不孕方

丹溪植芝湯

治婦人肥盛無子以脂膜閉塞子宮也宜服此

丹溪茂芝丸

治同前

蠃斯丸

即秦桂丸無當歸防風

消脂膜導痰湯

一方治肥盛婦人稟厚恣酒食經不調胎滿溢不能成胎

治婢妾不孕方附治婦人妬嫉方

煮附丸治婢妾多鬱情不宜暢經多不調故難成孕此方最妙

一方治婦人妬妄誤夫無子常服不妬

附斷子方

計四方二論

卷之七

浮腫

論浮腫由血水分證治不同

治方

椒仁丸治先因經斷後至浮腫小便不利血化為水名曰血分

葶蘆丸治先因小便不利後至身面浮腫名水分

人參丸一名亭歷治經脈不利血化為水相類

小調經散治敗血停積日久腐化成水變為浮腫忌利水藥產後浮腫亦宜

桑白皮散治脚氣感發兩足浮腫小便赤澀腹脹氣急坐卧不得

正腕散

治中焦虛痞兩脇氣痛面目手足浮腫大便閉澀兼治脚氣

大調經散

治寒濕發熱不調陰陽相兼增寒發熱自汗浮腫

大腹皮散

治婦人血嬰單單腹腫

大黃甘遂湯

治婦人小腹滿如敦敦狀小便微澀不竭產後水血併結血室

前陰諸疾論

論陰戶腫痛

論陰痒生蟲

論陰戶生瘡

附陰痔併茄子疾

論陰挺下脫

論陰冷

論交接出血作痛

論傷丈夫頭痛

脉法

治陰戶腫痛方

龍膽瀉肝湯

治肝經濕熱兩脇腫攢作痛小便澀陰挺如菌或出如蟲等症

加味四物湯

治陰戶腫痛

九味柴胡湯

治肝結核凡肝膽瘡瘍瘰癧脇肋熱下注便毒腫痛或小腹

加味小柴胡湯

治肝經腫脹小便不利寒熱往來肺熱潮熱胸脇作痛

加味逍遙散

治肝氣鬱結胸脇作痛

首烏散

治月水澀滯

加味逍遙散

治婦人肝脾血虛濕熱下注

菖蒲散

治陰戶腫痛

麻黃湯洗方

治陰腫

經心錄方

治陰中腫

白礬散

治陰腫

黑白散

治陰中

枳橘熨

治陰腫如石痛不可忍二便不利

雜方

治陰中腫痛

治陰痒生蟲方

大黃散

治陰痒

硫鯉丸

治陰中蟲亦

廣濟方

治陰痒不止

一方

治陰中生細蟲痒不可忍若食臟即死

又方

治同上

聖惠方

治陰中蟲痒痛目腫身黃欲得男子痛血下白少氣思美食

崔氏療陰痒不可忍方

又三方

治陰戶生瘡方

補心湯

治陰戶瘡名蠹瘡或痛痒如蟲行濃水淋瀝陰蝕已盡並治

藿香養胃湯

治陽明虛不榮

一方 治陰瘡膿水淋漓痒痛

塌腫湯 治陰瘡痛痒膿水淋瀝

治陰瘡方

治陰瘡與男子妬精瘡大同小異

治疳瘡

因月後行房致成湛濁伏流陰道疳生搔痒無時

黃芩湯洗方

療陰中瘡

雄黃散

當歸湯

治陰蝕

又方

肘後方

治陰瘡痒痛

銅綠散

治男婦陰部濕淹瘡

麝香杏仁散

治陰瘡

柏蛤散

治下疳濕瘡

又方

治陰痔方

治陰中生痔九竅有肉突出者名爲痔

洗方

治疳子疾

傳藥

又方

治同上

治陰挺下脫方

白合延下脫方
當歸散治婦人陰中突出一物長五六寸名陰挺又一名瘰癧又方治

三葉丸治陰中一物牽引腰腹膨脹痛甚不思食因服熱藥煎燂或非理房事

一稔金丸服前藥未效服此又附一方妙治陰挺下脫方

又方計西董莖法

托藥 摻藥

敷藥

治陰冷方

五加皮浸酒方治婦人癖瘦陰冷

八味丸治血弱不能榮養臟腑津液枯治陰冷方

又三方 溫中坐藥方二

治交接出血作痛方

千金方治女人交接出血又五方

小戶嫁痛方

又三方

治傷丈夫頭痛方

附脚指縫裏方

集驗方

療婦人傷丈夫四肢沉重嘔吸頭痛

桑白皮湯

治傷丈夫若頭痛欲嘔悶

金蓮穩步膏

治婦人脚損縫裏痛

卷之八

胎前門

論胎屬十二經所養

論治胎產三禁

論胎前調理法

論胎前用藥法

孕婦食忌

孕婦藥忌

孕婦起居忌

候胎法

診婦人有姙歌

驗胎方

神方驗胎散
婦人兩三個月月經不行此藥可驗

驗胎方
已經三月者驗之

艾醋湯
過月難明或月數未足難明者

探胎散

逐月養胎法

烏雞湯
娠一月寒多為痛熱多卒驚舉重服痛腹滿胞急卒有所下當預安之

補胎湯
者宜預服

艾葉湯
治娠二月寒熱風

黃連湯
曾傷二月胎者服

雄雞湯
治娠三月

茯神湯
曾傷三月胎者服

菊花湯
治娠四月

調中湯
曾傷四月胎者服

阿膠湯
治娠五月

安中湯
曾傷五月胎者服

麥門冬湯
治娠六月卒動不安

柴胡湯
曾傷六月胎者服

葱白湯
治娠七月

杏仁湯
曾傷七月胎者服

芍藥湯
治娠八月

葵子湯
曾傷八月胎者服

半夏湯
治娠九月下痢等症

豬腎湯 曾傷九月胎者宜預服

惡阻

半夏茯苓湯 治惡阻嘔吐心煩眩暈惡食好酸多臥有痰胎孕不牢

陳皮半夏湯 治氣血不足惡阻嘔吐不食

縮砂二陳湯 治妊娠嘔吐飲食不化

青竹如湯 治惡阻嘔吐不食

一方 治妊娠惡食心煩

茯苓丸 治惡阻心煩嘔吐眩暈

橘皮湯 治惡阻不食

人參丁香散 治惡阻胃寒吐逆

白米散 治妊娠氣不和

縮砂散 治胃虛氣逆嘔吐不食

旋覆花湯 治妊娠六七月胎不安惡阻嘔吐

參橘散 治妊娠惡阻嘔吐痰水不食心煩

蘆根湯 治惡阻嘔吐不食吐痰水

人參半夏丸 治惡阻嘔吐不食

歸原散 治惡阻嘔吐頭痛全不食諸藥不效

白米湯 治胃虛惡阻吐水

二香散 治胎不安氣不升降嘔吐酸水

保生湯 治惡阻嘔吐瀉渴

婦科新目

婦科新目

胎動不安

安胎散

治娠常服安胎

芩朮湯

常服健脾胃清熱安胎

金匱當歸散

養血清熱孕婦常宜懷人血少者服

釣藤湯

治娠八九月胎動腹痛面青冷汗氣欲絕者急服之

十聖散

治因母疾氣衰血少不能護胎者宜服

黃芩湯

治胎動腹痛下黃汗

佛手散

治娠因寒濕胎動不安或子死腹中惡露不下疼痛不已

小膠艾湯

治傷損動胎下血腹痛

膠艾歸湯

治娠二三月至八九月顛仆失胎動腹痛欲死已有所不

阿膠散

治娠或因顛仆或因毒藥胎不安腰痛腹痛有所下者

當歸湯

治胎動盛心煩躁悶絕口乾橫生逆產上衝下築迷悶唇青肢令

一方

治娠從高墜下腹中下血煩悶

三物解毒湯

治誤服毒藥動胎

白扁豆散

治誤服諸般毒藥毒物

胎漏下血

附經來

加減膠艾湯

治胎動漏血

安胎飲

治妊娠卒然腰痛下血不已

大金丹

治妊娠三四月腹痛時時下血

如聖湯

治胎動腹痛

安胎當歸湯

治妊娠舉動驚悸胎不安小腹痛引腰絡下血

枳殼湯

治胎漏

當歸寄生湯

治胎漏非時下血

二黃散

治胎漏

阿膠散

治無故卒然下血

一方

治胎漏不止胞乾即死

榆白皮散

治胎漏難產

一方

治忽暴下血數升胎燥不安

子芩散

治肝熱下血妄行

防風丸

治肝風血散不歸

防風黃芩丸

治肝經風熱致血崩便血尿血

本事方

治胎漏不止

桂枝茯苓丸

治宿癥經斷三月漏下不止臍上為癥害妊六月動者後月斷也

大金丹

治娠忽下黃汁如豆汁等物胎動不安

銀亭酒

治娠下黃汁或赤豆汁

煩躁

即子煩口乾

竹葉湯

治妊娠心驚胆怯終日煩悶

知母飲

治心脾熱咽膈渴苦煩悶多驚

犀角散

治子煩

當歸散

同前

人參散治熱乘心脾津液

竹茹湯治煩躁

治妊娠心煩熱不止

一母丸治因服藥胎不安似虛煩不得眠謂之子煩作虛煩治損胎氣

心腹脹滿惡子

紫蘇飲治胎氣奏上心腹脹滿疼痛謂之

有案

訶梨勒散治胎人心中腹脹滿氣衝胸膈

保胎和氣飲治胎前四五個月困倦氣急發熱飲食無味食睡頭暈

瘦胎飲治胎前五六個月胎動困弱 枳殼湯治妊娠

葱白湯治胎上通心煩 一方治胎上 艾醋湯治胎動衝心煩悶

倉公下氣湯治心腹兩脇脹悶飲 當歸湯治胎動衝心煩悶

大聖散治婦人怔悸睡中多驚

治妊娠遍身痛或衝心欲死不能飲食 一方治心下痛

安胎和氣飲

治胎冷腸痛引兩脇
小便頻數大便虛滑

仲景附子湯

治娠六七月脈弦發熱胎脹腹
痛惡寒小腹如扇子臍寒也

心痛論

火龍散

治妊娠心痛

白朮湯

治妊娠卒心痛欲死

一方

治妊娠中惡忽心痛悶絕欲死

產寶丸

治妊娠卒心痛欲死

千金方

治妊娠心痛

一方

雜方

三

補遺五方

沉香降氣湯
紫蘇飲

單延胡索飲
茯苓補心湯

四七湯

心腹痛論方

川芎散

治妊娠素有冷氣
忽心腹痛如刺

阿膠散

治妊娠胎動
腹痛不思食

當歸芍藥散

治娠腹中
後崩中去血過多
眩暈虛乏

一方

治妊娠腹痛
胎動不安

又一方治胎動不安

一治胎前產後諸症

香莢散 治娠五月胸膈悶氣刺痛滿腸鳴 有案

古今錄驗方 治娠腹內冷痛胎動

又一方 治胎動欲落腹痛不可忍

一方 治娠腹痛

一方 治娠四五月忽然疴痛

腹痛論方

地黃當歸湯 治胎痛

加味四物湯 治血少胎痛

小腹痛論方

療娠被驚惱胎向下不安小腹連腰痛下血

補遺湯 治小腹胎動不安

腰腹及背痛論方

通氣散 治娠腹腰痛不再忍神效

五加皮散 治娠腰痛不可忍

五加皮丸 治娠腰痛

療觸動胎以致腰痛背痛

療娠氣壅攻腰痛不可忍兼治腹痛

小晶芋根方

治損胎腰腹痛
去血胎向下

大地黃丸

治產前後腰腹痛
一切血疼四肢不舉
骨髓寒熱

紫酒

治妊娠腰痛如折
亦治常人在腰

雜方

四道
俱妙

胎水腫滿論方

即子腫子
滿子氣

白朮散

治妊娠面目虛浮
四肢腫如水氣

木通散

治妊娠身體浮腫
四肢脹急小便不利

葶藶散

治妊娠遍身
洪腫

千金鯉魚湯

治妊娠身浮腫
小便赤澀

一方

防已湯

治妊娠身浮腫
小便不利

澤瀉散

治遍身浮腫
上氣喘急

產寶方

治妊娠身腫
小便數

天仙膝散

治妊娠成胎之後
兩足面漸腫至腰

崔氏方

治體腫水氣
心腹急滿

腎着湯

治妊娠
腰脚腫

子和方

治脚土至腹腫
小便不利微渴

腹中鐘鳴方

產寶方

治小兒在腹中哭
及孕婦腹內鐘鳴

補遺方

治腹內
見哭

一法論有

積聚論問出素

丹溪方治血塊如盤有孕難服咳劑者此方

卷之九

胎前門

傷食

平胃散治妊娠飲食停滯或吐腹作痛

木香丸治妊娠脾胃虛食不消膨脹吐瀉

中惡

當歸散治妊娠中惡心腹疔痛

散滯湯治觸惡氣傷胎肚痛手不可近不思食

又方計二首

六君子湯治脾胃虛弱飲食難化腹滿泄瀉

白朮散治妊娠脾胃氣不和飲食易傷

又方計一首

補遺方治妊娠中惡心腹絞痛如鬼繫不可按或吐衄血者

傷寒

白朮散

治傷寒熱病先以此安胎但覺頭疼發熱者可服四肢厥冷陰症也不可服

安胎阿膠散

治妊娠傷寒時氣先以此安胎却以主藥問服

香蘇散

凡妊娠傷寒勿論日數但見惡寒頭痛以此主之

羌活湯

解利傷寒不問何經所受妊娠尤宜

黃龍湯

治妊娠傷寒邪在半表半裏者

三黃解毒湯

治妊娠傷寒表邪悉罷煩躁大渴六脈沉實此主之

黃耆解肌湯

治妊娠傷風白汗

桂枝芍藥當歸湯

治孕婦傷寒脈浮頭重腹中切痛

芍藥湯

治妊娠傷寒白利腹中痛飲食不下

加減當歸六黃湯

治妊娠傷寒發汗不止胎氣損者

加味黃芩湯

治妊娠傷寒下後協熱而利胎氣損

加味竹葉湯

治妊娠傷寒下後虛熱不除

黃龍四物湯

治妊娠傷寒瘧後發熱

加減四物湯

治妊娠傷寒發熱如錦文

梔子大青湯

治妊娠傷寒斑變為黑色

一方

治妊娠傷寒發熱忽黑小便如血胎欲落

護胎法

治傷寒熱病護胎

護胎法

治孕婦一切有熱諸症

中風

防風散

治妊婦中風悶亂口禁因肢強急

防已散

治妊婦中風口眼喎斜手足頑痺

赤箭丸

治妊婦中風手足不隨筋脉緩急言蹇不仁

醋艾熨法

治妊婦因外感風如中風狀不省人事

風痙

卽子痙

羚羊角散

治妊婦胃悶角弓反張

芎活湯

治子癰逐產後惡血下胞

瘈瘲

鈎藤湯

方見胎動不安

子瘡

大全論

生犀角散

治妊婦卒中風不語強直悶亂昏潰

曰僵蠶散

治妊婦中風口禁心隔痰壅不語強直

白朮酒

治妊婦中風口禁言語不得

葛根湯

治妊婦臨月發風痙悶憤吐道少醒復發

羌活酒

治妊婦中風痙日禁強直角弓反張

黃帝問

欬嗽

桔梗散

治妊娠肺壅咳喘急不食

馬兜鈴散

治妊娠胎氣壅塞咳嗽氣喘

百合散

治妊娠風壅咳喘痰多喘滿

紫菀湯

治妊娠咳嗽不止胎動不安

喘急

平安散

治妊娠上氣喘急大不通嘔吐不食腹脇脹痛

桔梗湯

馬兜鈴散

二方見前

吐血衄血咳唾血

河間生地黃散

治諸

局方必勝散

治男婦諸血妄流

瘧疾

七寶散

治男婦切瘧疾

人參養胃湯

治妊娠瘧疾寒多熱少頭痛惡心面青白脉弦遲

清脾飲

治妊娠瘧疾熱多寒少口乾便閉脉弦數

驅邪散

治妊娠停食感冷瘧疾

柴胡散

治妊娠瘧疾

又方 治瘡疾

霍亂

香蘇散加藿香方

治妊娠霍亂

七味白朮散

治脾胃虛弱吐瀉作渴不食

人參散

治妊娠霍亂吐瀉心煩復痛飲食不入

木瓜煎

治妊娠霍亂吐瀉轉筋悶絕

益元散

冬葵子湯

並治霍亂

泄瀉

胃苓湯

治脾濕太過胃氣不和腹痛泄瀉

胃風湯

治風冷乘虛入客灰色米治不一化泄瀉注下濕毒豆汁瘀血等

加味治中湯

治飲食過多脾胃氣不能運化而瀉

錢氏益黃散

治妊娠泄瀉嘔腹情手足冷

不換金正氣散

治施見傷娠泄瀉

一加味理中湯

治妊娠泄瀉

桂冬甘露飲

竹茹湯

治霍亂

白朮散

治妊娠霍亂腹痛吐利不止

理中湯

治妊娠霍亂復痛四肢逆冷汗出脈虛

回生散

治中氣不和霍亂吐瀉胃氣存者服之何生

草果散

治臟腑虛寒
腹痛泄瀉

痢疾

白朮湯

一名三
物湯

治孕妊
痢膿血

黃連湯

治妊婦下痢赤
白膿血不止

三黃熱艾湯

治妊婦下痢
熱下痢

大寧散

治妊婦下痢赤白
灰色泄瀉痛垂死

鴨蛋湯

治胎前產
後赤白痢

大小便不通

大腹皮散

治妊婦大
小便不通

當歸散

治妊婦因怒肚腹脹痛四肢腫
喘急大便難小更趾產門腫

一方

治妊婦風氣
大便秘澀

又方

治大小
便秘

當歸芍藥湯

治妊婦腹中
疼痛赤白

蒙薑黃連湯

治妊婦下痢赤白
道腫痛冷熱皆可

歸蓍湯

治妊婦下痢
痛小便澀滯

厚朴散

治妊婦下痢
黃水不絕

二黃散

治妊婦下痢赤
白絞刺疼痛

一方

治虛羸
大便秘

甘遂散治胎前產後大小便不通

葵子湯

治妊娠得病六七日以上身熱入臟大小便不利安胎除熱

又方

猪苓散

治妊娠小便澁痛兼治胎水

甘遂散

治妊娠子淋大小便並不利氣急

小便不通

冬葵子散

治妊娠轉胞小便不通男子皆效

全生茯苓散

治妊娠小便不通

葵榆湯

治妊娠小便不通臍下妨悶煩亂

獨聖散

治妊娠小便不通

歸母苦參丸

治妊娠小便難飲食如故

雜方

治妊娠卒不得小便

子淋

五淋皮

治孕婦熱結膀胱小便淋瀝

子淋散

治妊娠小便澁痛頻數

安榮散

治妊娠小便澁少遂成淋瀝

加味木通湯

治妊婦喜食炙博辛熱致小便赤澁作痛

生津湯

治妊娠膏病自汗下痢後小便短少不痛

大腹皮散

治妊婦八九月胎形肥碩小便短少小腹脹

冬葵子湯

治妊婦赤澁而痛此胎熱也

地膚子湯

治孕婦小便澁痛

地膚大黃湯

治妊婦子淋宜下

一方

療妊娠數月小便淋瀝疼痛

補遺方

治胎前諸淋小便不通

雜方

治妊娠子淋

遺尿

白薇散

治妊娠尿出不止

一方

桑螵蛸散

治妊娠小便不禁

一方

並治妊婦遺尿

尿血

續斷湯

治妊娠下血及尿血

一方

治妊娠尿血

薑蜜湯

治妊娠小便尿血

加減五苓散

雜方

計六方

眼目

天門冬飲子

治妊娠肝經風熱上攻眼目帶眵失明

胎前產後

治婦人藏燥

治胎前產後心虛驚悸

天門冬飲子治妊娠肝經風熱上
臟燥悲傷

甘麥大棗湯治婦人臟燥悲傷不止

膽竹茹湯治妊娠心虛驚悸

又方治胎臟燥自笑自哭

妊娠下胎

桂心散治妊娠因病胎不能安可下之

方

千金神造湯治雙軀少陰脈微緊此一獨死此方主之
下胎方能安可下之

又方計五首

防胎自墮

芎藭補中湯治血氣虛弱不能養胎數月而墮

阿膠湯治數墮胎小腹

千金保胎丸治婦人受孕經三月而胎墮者

杜仲丸治妊娠三兩個月胎動不安

刪繁方治妊娠懷胎數月落而不結實

胎墮後為坐產

人參湯

治半產血下過多心驚目
暈或寒熱臍腹虛脹疼痛

人參黃耆湯

治小產氣虛
血下不止

龍骨散

療娠損下
惡血不止

全生活血湯

治婦人分娩或半
產漏下昏冒不省

生地黃湯

治妊娠胎氣損墮後
惡滯不尽腹中疝痛

當歸酒

治墮胎後
血不出

烏金散

治墮胎後
血不下

紅藍花散

治墮胎後血不出
奔心悶絕不識人

白蜜湯

治墮胎後
惡血不出

當歸湯

地黃湯

澤蘭湯

蒲黃酒

已上四方治
胞衣不下

當歸川芎湯

治小產後瘀血
心腹痛或寒熱

芎藭湯

治墮胎心
腹冷痛

當歸散

治產後氣血虛弱惡
露內停增寒發熱

當歸補血湯

治燥熱目赤面
紅脉洪大而虛

四物二連湯

治血虛
發熱

胎不長

安胎白朮散

治妊娠風有
冷胎萎不長

黃耆湯

治胎不長
安胎和氣

長胎白朮丸

治孕婦風有
風冷胎不長

人參丸

主妊娠
胎不長

先期產過期不產
中孕七治妊日

鬼子丸治妊月不
產而流

先期欲產過期不產

知母丸 治妊娠日月未足痛欲產

槐子丸 治妊娠月不足而似欲產

又方 計三首

加味四物湯 治過月不產用此補血行滯

鬼胎

斬鬼丹 治鬼胎如抱一塊

斑玄丸 治鬼胎或於妖魅

雄黃丸 治鬼胎瘕血腹痛

枳實積榔丸 治妊娠瘕瘕痞塊

卷之十

臨產門

論臨產調理法

臨產催生法

論難產由於安佚氣滯

論難產由於氣虛不運

論難產由於血滯血乾

論十產 楊子建

產難治驗

論交骨不開

論胎死腹中

臨產脈法

臨月束胎方

束胎丸 束胎易生

達生散 孕至八九月服之易產

又方 第九個月服

滑胎枳殼散 孕至八九月服之易產

內補丸 治妊娠衝任脉虛補血安胎

張氏方 治胎肥壅隘臨月服之束胎易產

保生無憂散 治妊娠安逸甘肥不節致胎肥難產或血少胎弱八月服之易生

神寢丸 易產

難產催生方

三合濟生湯 治產難不下服此即生

佛手散 即芍藥治因事子死亞露妄行腹痛服此探之若死即下痛減子母俱全

來麤散 治臨產用力太過脉微神倦致頭暈此際面青髮直不省人事

黑神散 一名催生如神散治橫生逆產及胎前產後崩漏不止

榆白皮散 治妊婦滑胎易生

如聖散 治妊婦難產

備生膏 治產後腹痛腰痛

七聖散 一名七

臨產腰

催生散 治產難并胎衣不下

催生散 治臨產生育難

催生湯 候產母腹痛腰痛見胞漿下方服

七聖散 一名七聖散 臨產腰痛可服

活水無憂散 治因恣情多契熱毒之物瘀血相搏臨產橫逆兼進烏金丸

一方 治宿有病產難累日不下氣力乏盡

勝金散 治產難由於見枕破破血累子故難產服此逐其敗血

一方 治橫逆先露手足

油蜜煎 治產難胞漿乾不得下

芫腦丸 各催生丹 治產難及橫生逆產

柞木飲子 治產難橫逆成胎爛腹中脹悶服

催生如聖散 治胎漏血乾難產痛極

催生如意散 治橫生倒產

催生鉛丹 治橫逆難產

三退散 治橫逆難產于死腹中

滑產散 催生神効

一方 治產不順

一方 治橫逆難產

神妙乳砂丹 治諸難產

又方 治難產 計三首

如神散 催生累驗

小品方 治橫生倒產手足先出

一方 治橫逆難產手足先出

黃金散

治生一
二日難分
娩者

勝金丹

治難
神妙

催生萬金不傳遇仙丹

治難
產以此
九帛東
臍中

如聖膏

治產
難非胞
衣不下
死胎

一方

一方

並治
難下胎

立聖丹

治產
難橫逆
惡候死
胎不下

雜方

治產
難

計二十
三首

治交骨不開

龜殼散

治交
骨不開
不能
生

治胎死腹中

烏金散

治一
切產
難死
胎

香桂散

治下
死胎

平胃散

治死
胎不下
指甲
青古中
脹悶口
中作尿
臭

一方

治妊
娠三五
個月胎
死不出

千金神造湯

治動
胎難產
子死腹
中及雙
軀一死
一生服
之令死
出生安

一方

治胎
死腹中
乾燥
看皆

一方

治子
死半產
或半着
脊及胞
水早乾
胎溢不
下

一方

治胎
死腹中
或牛產
不下

半夏湯

治胎
衣不下
子死腹
中或血
衝上昏
悶或血
暴下胸
乾不能
產

胎死及見死胎中甲氣絛絛

一方不下胎產危急

下胎丸 治難產胞衣不出橫倒及兒死腹中母氣欲絕

一方 治胎死腹中胞衣不下臨產危急妙

霹靂奪命丹 治臨產驚然氣痿目翻口禁

宣明砂散 治胎死不下

牛膝丸 下死胎

一方 治產難數日子死

如聖膏 治難產及死胎下胞衣

一字神散 治子死腹中胞大不干

雜方 治死胎計二十三首

卷之十一

產後門

論產後調理法

論產後大補氣血為主

論產後服藥之誤

論新產三病

產後諸忌

脉法

胞衣不下

奪命丹 治胸衣不下由胞為此所脹

奪命丸 治胞衣不下并死胎

牛膝湯 治胞衣不出臍腹堅

牛膝散 治胞衣不出腹中脹痛

加桂芎歸湯 治產母元氣虛胎

黑龍丹 治產難及胞衣不下血迷

花盤石散 治產後敗血不盡血暈胎死胞衣

一方治胞衣

千金備急丸 治產後惡血衝

胡氏方 治胞衣

雜方 治胞衣不下

血暈 附厥

清魂散 治產後氣血暴虛血隨氣

芎歸湯 治產後去血過

保命集方 治產後血

醋墨 治產便服

獨行散 治產後血暈

奪命散 治產後血暈血八

四味散 治產後一

黑神散 治產後胎衣不下

紅花散 治血昏血暈血崩

鹿角散 治產後血暈由

鬱金散 治產後血上衝

治血 雜方 計六

牡丹散治產後血暈

荆芥散治產後風虛血暈精神昏昧

一方

倉公治產後血厥而胃

惡露不下

起枕散治惡血不行心腹及兒枕痛

通瘀飲治惡露不通昏沉寒熱

保命集方治惡血不下

黑龍丹見胞衣不下

血露不絕

論血露不絕

加味四物湯治崩如豆汁紫色過多

應書一方治產後心煩干嘔煩執氣力欲盡血暈運心頭硬者

一方

一方俱治風虛血暈

白薇湯治產後胃弱多汗亡血發厥

荷葉散治惡露不下疼痛煩悶

廣濟方治惡露不下

沒藥丸治惡露方行忽止驟爾寒熱臍腹百脉皆痛

治惡血不下雜方計三首

芎歸加芍藥湯治血崩眩暈

一方治產後七八日惡露不止

加味四物湯 治產後月餘經血淋瀝

烏金散 治敗血為暈及淋瀝崩中

豆淋酒 治產後餘血水氣

一方 治同上

牡礪散 治惡露淋瀝煩熱解瘦

血崩不止

論血崩不止

加味四物湯 治崩如豆汁紫色過多者二方見惡露不絕

乾熟地黃散 治崩中旋暈神昏煩亂

瑞蓮散 治崩漏如湧泉

千金方 治崩中下血

心痛

千金方 治惡血不盡或經歲月

一方 治惡血崩漏不禁

蒲醋飲子 治新產逐敗生新

一方 療產後世血無度

芎歸加芍藥湯 治血崩眩暈

奇效四物湯 治血崩素有熱者方見血崩

阿膠丸 治崩中下血虛羸

固經丸 治血氣未復房事及勞役致血暴崩

大巖瘡湯

一名桂心湯

治素有宿寒因寒發血衝心作痛

失笑散

治惡血上攻心腹病痛

黃金散

治惡血上衝心腹作痛或發熱作渴

火龍散

治氣滯心痛

伏龍肝散

治惡物不出上攻心痛

一方

治惡血衝心痛悶欲絕

一方

治產後血不盡心腹痛

腹痛

並小腹痛

加味四物湯

治惡露不盡腹痛

海臧方

治敗血作痛

一方

一方

俱治敗血作痛

當歸蒲延散

治產後血瘕及臍下脹滿作痛

延胡索散

治惡血攻刺不論新入

延胡散

治兒枕腹痛

烏金散

治敗血走刺心腹見枕痛

地黃散

治惡血不盡腹中病痛

四神散

治瘀血不消成塊心腹切痛

黑神散

治產後血塊痛

丹溪散

治血塊痛發熱

卷荷散

治惡血衝心血刺血暈血氣腹痛

荷葉散

治惡露不下腹中疼痛煩悶

又方

治下血不盡腹內堅痛不可忍

產寶湯

治餘血作痛兼塊

香桂散

治臍下疼痛不止

當歸養血丸

治惡血不散發渴心腹疼痛連及腰痛

玉燭散

治惡露凝結大便燥結

下瘀血湯

治腹中乾血痛

千金桃仁芍藥湯

治產後腹痛

獨聖散

治血虛腹痛

定痛散

治產後惡露不止

當歸建中湯

治產後虛羸腹中刺痛引腰背不能食

天方

治產後餘疾腹中絞痛屢之不下食

隱居澤蘭湯

治惡血腹痛胸滿小氣

又方

治惡露結聚小腹疼痛

延胡索

一名三聖散又名神湯

治臍下並腰痛

當歸血竭丸

治惡露成塊心腹疼痛及臍下堅痛

紫金丸

治惡露不快腹痛寒熱

枳實芍藥散

治腹痛煩滿不得卧

保命方

治血暈血結

增損四物湯

治產後陰陽不和乍寒乍熱

當歸散

治產後血虛氣滯以致發熱腹痛脇脹痛

羊肉湯

治產後虛弱所乘腹痛及臍下脹痛

生料五積散

治產後內有餘血外感寒邪相搏腹痛

脇脹痛

乾地黃湯

治產後兩脇滿痛兼除百病

蘇葛湯

療產後惡露不下血氣壅痞脇脹不食

當歸散

治產後腹痛脇肋脹滿

抵聖湯

治產後腹脇悶滿或嘔吐者

腰痛

當歸黃耆湯

治產後血失過多腰痛身熱自汗

如神湯

治產後瘀血腰痛

廣濟方

治產後虛冷血氣流八腰腿痛不可轉

桃仁湯

治產後惡露方行忽斷腰中重痛或流注兩股痛如錐刺此由血滯經絡

五香連翹湯

治產後瘀血腰痛作癱

經效方

治產後肝經氣滯不平脇脹腹痛寒熱往來內執滿熱

經效方

理血氣煩悶脇脹滿及痛

廣濟方

治產後腹痛氣脹脇下悶不下食

玄胡四物湯

治血癖腹痛及血刺腰痛

又方

即生料五積散加桃仁

寄生防風湯

治產後風邪頭眩腰痛四肢沉重

頸痛

一奇散 即芎 治產後血

芎烏散 治產後氣

芎附散 治產後氣虛頭

加減四物湯 治產後頭痛血虛痰

遍身疼痛

趁痛散 治產後氣弱血

五積散 治產後身痛

加味四物湯 治產後血

大千方 治產後偏身青

脚氣

獨活寄生湯 治肝腎虛弱腹濕風

大防風湯 治陰虛邪襲

卷之十二

外感風寒

加味芎歸湯 治產後外感風寒

竹葉湯 治產後中風發熱

中風

小續命湯 治產後中風身體緩急頑痺不仁

此愈風散血暈不省人事
血風湯
及方治產後半身不遂言語蹇

華陀愈風散 治產後中風及血暈不省人事

血風湯 治產後諸風

防風湯 治產後中風背項強急胸滿氣

雲岐方 治產後半身不遂言語楚澁恍惚多忘精神不定

防風羊角湯 治產後氣血不足風邪所襲

川芎散 治產後中風如繩束狀

寶瓶上丹 治產後去血過多氣無所至虛極生風

大豆紫湯 治產後風虛氣血不調等症

獨活酒 治產後中風

鷄天酒 治產後中風並男子一切風症

交加散 治婦人榮衛不通經脈不調產前後百病

一物獨活湯 治產後中風虛人不可服他藥者

羌舌散 治前

發瘧 一作瘧

小續命湯 治產後汗多變瘧口禁背強搖頭馬嘶不時舉發

大豆紫湯 治中風頭眩惡風自汗及產後百病或中風非瘧緊大者不治

大豆湯 治產後中風發瘧婦人振挾風兼任毒諸疾

一方 治產後中風

羚羊角飲子 治產後氣實心煩渴欲飲水欲成剛瘧中風之疾

防風當歸散

瘕瘕

防風湯

治風虛發熱項背拘急恍惚任言亦治腳氣緩弱

華心愈風散

方見中風

當歸散

治產後中風

增損紫胡湯

治產後手足牽搐涎潮昏悶

秦艽湯

前證去後方服此藥

拘攣

舒筋湯

治一切胸攣疼痛風濕所傷氣血凝滯

芎藭散

治產後中風筋攣急

防已膏

治產後中風身痺痺攣急

不語

八珍散

治產後停積敗血閉于心驚神志不明古強不語

胡氏孤鳳散

治產後開目不語

一方

治產後不語

逐血補心湯

治產後失音不語

狂言譫語

一聖三聖散

治產後收血衝氣心發熱狂言

奪命丹

治產後血熱心經語言顛狂健忘失志

調經散 治陰虛發熱瘀血

妙香散 治產後心神煩

四物補心湯 治產後語

琥珀地黃丸 治產後語

顛狂

大聖澤蘭散 治血海虛冷久無子息及產後

抱龍丸 治產後過驚發狂

加味八珍湯 治產後血虛

調經散 方見前在

茯神散 治產後心神恍惚言

驚悸

加味四物湯 治產後

恒子仁 治產後元氣虛

烏金散 治產後狂

寧神膏 治失血過多心神

辰砂遠志丸 治產後中風驚

見鬼神

琥珀散 治產後瘀血攻心

一方 治產後血暈

白茯苓散 治產後心神驚

乾熟地黃散

治產後心
神驚悸

產乳七寶散

治產後調和氣血
補虛安神鎮驚

人參散

治產後心
虛驚悸

琥珀散

治血虛驚悸
敗血停留

茯苓散

治產後精
神性亂

一方

治產後虛弱或汗下
重虛或中風昏悶

歸脾湯

治產後血氣大虛驚悸
不寐嗜臥少食等症

遠志丸

治產後心神驚悸腹
中急痛夜臥不寧

白茯苓丸

治產後心
虛驚悸

恍惚

千金方

治產後暴苦心悸
語言錯亂恍惚

經效方

治產後心虛驚
悸煩燥恍惚

琥珀散

治產後中風恍惚心
神煩悶四肢不隨

遠志散

治產後中風心神恍惚
言語錯亂睡臥不安

天麻丸

治產後中風恍惚
語澁四肢不隨一

辰砂遠志丸

治產後中風消風
化痰安神鎮心

卷之十三

產後下

虛煩

金黃散

治產後惡血衝心時發煩躁

川芎散

治產後餘血不盡衝心煩悶腹痛

經效方

治產後氣虛令搏於血血氣結滯土衝心腹脹滿

治血氣煩悶雜方

竹葉湯

治產後短氣欲經心口煩悶

薤白湯

治產後胸中煩熱氣逆

仲景二物黃芩湯

治在褥自發露得風四肢煩熱

經驗方

治產後煩躁

發渴

千金竹葉湯

治產後煩躁

熟地黃湯

治產後虛渴

清心蓮子飲

治產後心煩

荷葉散

治產後宿血不散衝心迷悶

集驗方

治產後血氣煩悶

沒藥丸

治產後心腹煩躁惡血不快

人參當歸湯

治產後去血過多陰虛內熱心煩短氣

甘竹茹湯

治產後內虛煩熱短氣

芍藥梔子豉湯

治產後虛煩不眠

竹皮大丸

治產後中虛煩亂嘔逆

竹葉歸蓍湯

治胃氣虛熱口渴

七味白朮湯

治中氣虛弱津少口渴

產寶方

治產後大便渴不止

括蔓根湯

治產後血渴

黃芩散

治產後血渴

當歸補血湯

治產後血脫煩躁脉洪大而虛重按全無者

一方治渴

一方

治產後虛煩發渴

一方

治產後中風發渴

桃花散

治產後不煩而渴

自汗

黃耆湯

治產後虛汗不止

麻黃根散

同前

止汗散

治產後盜汗不止

當歸二黃湯

治產後自汗盜汗

當歸六黃湯

治產後汗不止

人參湯

治產後諸虛發熱盜汗

參附湯

治陽氣虛寒自汗惡寒逆冷自利或臍腹疼痛吃逆汗多發痙

薯附湯

治陽氣虛脫惡寒自汗或口噤痰湧逆冷吐瀉虛寒等症

千金方

治產後風虛汗出四肢拘急難以屈伸

全生活血湯

治產後冒悶發熱自汗盜汗目眈眈四肢無力行步欹側

發熱

丹桂枝湯治產後血

九味羌活湯治產後諸虛

丹溪方

治產後發熱

抽薪散

治產後血虛發熱

人參當歸散

治產後去血過多陰虛內熱

犀角飲子散

治產後虛損發熱

往來寒熱

柴胡四物湯

治產後往來寒熱

增損四物湯

治產後陰陽不和乍寒乍熱

大調經散

治產後惡露未消敗濁凝滯榮衛不調增寒發熱

小柴胡加生地黃湯

治產後脈弦往來寒熱

產寶方

治產後寒熱口中生瘡乾嘔悶絕

瘧疾

草果飲子

治產後瘧疾多熱者

加味四物湯

治產後陰虛發熱

人參散

治產後諸虛發熱盜汗

加味逍遙散

治產後發熱

三合散

治產後虛損發熱

增損柴胡湯

治產後虛弱寒熱如瘧

更生散

治產後去血過多不止眩暈眼暗口噤發熱增寒

黃龍湯

治產後傷風熱八胞中寒熱如瘧

加減烏金散

治產後寒熱似瘧

知母湯

治產後乍寒乍熱通身溫壯

生熟飲子

治產後瘧疾多寒者

清脾飲

治瘧疾寒多熱少者

人參養胃湯

治瘧疾寒多熱少者

七寶飲

治瘧疾久而不已者以此截之

蓐勞

白茯苓散

治產後蓐勞

當歸建中湯

治產後虛羸不足腹痛腰痛背自汗出

黃耆建中散

治產後諸虛發熱惡寒腹痛

加味佛手散

治產後血虛盜汗咳嗽有痰

柴胡四物湯

治產後日久虛勞脉大

三合湯

治產後虛勞

雲岐熟地黃散

治蓐勞四肢煩疼時發寒熱

黃耆丸

治產後蓐勞寒熱頭眩虛羸

石子湯

治產後虛羸乍寒乍熱四肢疼痛面色痿黃

人參驚風散

治產後蓐勞虛羸寒熱咳嗽盜汗等症

胡氏牡丹散

治產後虛羸發熱自汗或血氣所搏經後不調

黃耆煮散

治產後蓐勞肌瘦寒熱四肢痠疼心煩頭痛

猪腰子粥

治產後蓐勞發熱

虛羸

補虛湯

治產後一切雜病只大補氣血為主

黃耆四物湯

治產後虛弱要藥以芍藥酸寒能伐發生之氣故以黃耆易之

十全大補湯

治產後氣血未復休弱發熱惡寒

當歸羊肉湯

治產後虛弱

黃雌雞湯

治產後虛弱

產寶方

治產後虛弱不生肌肉

一方

治產後虛弱骨節疼痛頭扁汗不止

又方

同前

痞悶

見睨丸

治產後虛弱飲食停積心下作痛

腹脹

抵聖湯

治產後敗血入胃腹脹滿嘔吐不能納穀

香砂養胃湯

治產後敗血攻於脾胃腹脹嘔吐飲食不下

加味六君子湯

治飲食停滯於脾致腹脹嘔吐

加味平胃散

治產後腹脹

紫金丹

治產後衝脹胸中

又方

同前

自聖散

治產後腹中堅滿喘不得卧

浮腫

大調經散 治產後腫滿喘急

小調經散 治敗血乘虛停積流

經驗方 治產後遍身青腫

白朮湯 治心腹堅大如盤

正脾散 治產後通身浮腫及婦人

小調中湯 治產後一切浮腫

橘皮酒 治產後肌浮

丹溪方 治產後浮腫小便

奪魂散 治產後虛腫滿

張氏方 治產後血虛

漢防已散 治產後風虛氣壅

七聖丸 治產後浮腫心脇脹

加味吳茱萸湯 治產後吐瀉心

虛宿疾風冷胸滿腹痛

加味八物湯 治產後浮腫

面目浮腫惡寒泄瀉

加減金匱腎氣丸 治肺腎虛腰重脚腫小便

積聚

河間芍藥湯 治產後

四神散 治產後瘀血不

一方 治產後血虛作痛

桂心丸 治產後血氣不散

一方治產後血氣不調
產寶方治血痕痛無定處

千金方治血

霍亂

四生散治一切霍亂吐瀉

五苓散治霍亂渴而飲水者

理中丸治脾胃虛寒嘔吐泄瀉腹脹

白朮散治產後霍亂吐瀉腹痛煩渴逆冷大便不實

溫中散治產後霍亂吐瀉

附子散治產後霍亂手足逆冷

高良薑散治產後霍亂吐瀉利腹中疝痛

藿香正氣散治外感風寒內停飲食頭疼寒熱霍亂吐瀉瘧疾

來復丹治伏暑吐瀉

一方治吐逆不受湯藥者

嘔吐

香靈丸治產後嘔不止者

蒲黃散治產後三四日惡露不下嘔逆壯熱

橘紅半夏湯治胃虛嘔逆

開胃散治產後胃虛嘔逆胸滿不食

薑朮散治產後無他疾但嘔逆不食

石蓮散治產後胃寒嘔逆咳嗽腹脹

錢氏益黃散

治脾胃虛寒水來侮土嘔
不食腹痛泄瀉手足逆冷

加味四君子湯

治產後嘔
逆不已

吃嘔

丁香散

治產後心煩
咳噫不止

羌活散

治吃
逆

薑桂散

治產後
咳逆

一方

治產後
吃逆

一方

治產後吃逆
三五日不止

咳嗽

旋覆花湯

治產後感冒風寒咳嗽喘
滿痰涎壅盛鼻塞聲重

集驗方

治產後感冒
咳嗽多痰

二母散

治產後惡露上攻流
肺經咳嗽不已

異攻散

治脾胃虛弱久患咳嗽腹
滿不食面浮氣逆等症

經效方

治咳嗽多
痰氣急

一方

治產後咳
嗽氣喘

喘急

奪命散

治產後敗血衝
心崩漏上喘

二味參蘇飲

治產後血八於
脾胃黑發喘

五叶水湯
治產後傷風

六君加失笑散
治產後喘急

五味子湯

治產後喘促

旋覆花湯

治產後傷風喘嗽痰涎壅盛

見睨丸

治產後傷風冷飲食而喘

六君加失笑散

治產後喘急瘀血上湧

大補湯

治產後百日外而一浮腫氣急有汗

鼻衄

加味參蘇飲

濟陰綱目目錄

卷之十四

泄瀉

調中湯

治產後腸胃虛怯冷氣乘之腹脇刺痛洞瀉不止

薑薤理中丸

治產後元氣虛弱臍腹疼痛泄瀉又治男子脾胃虛弱久瀉

神效參香散

治產後脾胃虛寒滑瀉不止及痢積已盡滑瀉不止

痢疾

救急散

治產後赤白痢腹中絞痛

白頭翁

加甘草阿膠湯

治產後下痢虛極

黃連

治產後熱渴赤痢腹中痛

神效參香散

方證見前

一方

治產後血瀉不止餘血作痛兼理屬寒滑者

神仙感應丸

治產後固無積痢多有因食葷味早亦作痢者百無一生非此方不能救之

連翹

治產後久病赤白痢因脾胃不和致心腹脹滿乾嘔酸心飲食不下胸膈噎塞脇肋疼痛危困

三聖散

治產後血痢不止

一方

治產後痢日五十行者

治產後諸痢雜方

四首

治產後血痢雜方

二首

心效方

治產後痢渴飲無度數

經效方

治產後失痢津液涸渴不止

經驗方

治產後痢久津液枯竭四肢浮腫口舌乾燥

七味白朮散

治產後痢津液竭渴不止

大便秘澀

調導散

治婦人產後產前大便不通

麻仁

治產後去血過多津液枯渴不能轉送大便

滋陽五仁丸治產後血氣虛弱大阿膠枳殼丸治產後大

滋腸五仁丸

治產後血氣虛損大

阿膠枳殼丸

治產後大便秘滯

麻蘇粥

婦人產後有三種疾鬱胃則多汗江多則大便秘故難用藥麻蘇二子最為穩當

兵部手集方

治產後秘結不通膨滿氣急坐臥俱難

大小便不通

通氣散

治產後大便秘不通

桃仁散

治膀胱氣滯血溢

枳殼丸

治產後大便秘滯

一方

治產後大小便不利下血

金鑰匙散

治產後大小便秘不通腹脹

遺尿

補遺方

療產後遺尿不知亦治遺尿

集驗方

產後遺尿亦治男子

加味補中益氣湯

治脾腎虛寒大便不禁

還少丹

治脾腎虛弱遺精

四神丸

治脾腎虛弱大便不實或五更作渴

五味子散

治腎泄

廣濟方

治產後遺尿亦治男子

淋閉

茅根湯

治產後諸淋無問冷熱骨石氣結悉主之

滑石散

治產後熱淋

滑石通淋散

產後小便緊澁不通因血熱積於小腸經水不利愈食熱毒之物而成淋澁

石菖散

治婦人小便不通

加味四物湯

諸脉皆屬於此累效

一方

療產後淋小便痛及血淋

張氏方

療產後小便不通淋閉

療卒不得小便方

灸臍法

治產後小便不通腹脹如鼓悶亂不醒蓋緣未產之前內積治氣遂致產時尿胞運動不順

小便數

桑螵蛸散

治產後陽氣虛弱小便頻數及遺尿

括蓂散

療產後小便數兼渴

補遺方

療產後小便數及遺尿

小便不禁

千金方

治產後小便不禁

又方

治產後小便不禁

鷄內金散

治產後溺尿失禁

廣濟方

治產後小便不禁

黃耆當歸湯

婦人產後尿不禁而微浮者發熱於午後此膀胱為生痰所傷

固脬散

治婦人臨產時手傷脬破小便不禁

補脬飲

治產後傷動脬破終且不可小便但淋瀝不乾

小便出血

血餘散

治產後小便出血

滑石散

治產後小便出血

崔氏方

療產後血入大小腸

補遺方

治產後小便出血

大便出血

加味清胃散

治因膏梁積熱便血

的奇散

治產後月經不行餘血滲入大腸洞瀉不禁下青黑物

當歸黃耆散

治產後陰脫謂陰戶脫下也

加味八珍湯

治產後生腸不收

加味四物湯

治因產用力過多陰門突出

當歸散

治陰下脫又名顏面

硫黃散

治產後努力太過致陰下脫若脫肛狀及陰下挺出逼迫腫痛舉動房勞皆能發作清水續續小便淋瀝

烏椒湯

治陰下挺出

寸金散

治婦人子腸下不收

復元湯

治產後子宮不收

一方

有臨產子腸先出產後腸不收名曰盤腸脫花產

一方

產腸出俗用冷水熨母面其腸自收虛弱之人切不可用恐驚怯成病或即脫絕以此方治之

又方

治腸出久而不收為風吹乾不能收者

丹溪方

治產後腸不收

雜方

治盤腸產

又方

計十首

灸法

計五首

產門不開腫痛

十全大補湯

治產後血氣大虛陰門不開發熱惡寒

硫黃湯

治產後玉門不開

欬陰法

治新產後陰腫下臉及產門不合

當歸湯

治產後腹中風冷陰戶腫痛

一方

治婦人子宮大痛不可忽怕產後生腸不收

桃仁膏

治產後陰腫妨悶

一方

治產後陰腫

萬應丸

治產後小戶痛不可忍

一方

治產後陰內兩傍腫痛手足不能舒伸者

乳汁不行

通草湯

治產後血氣盛實乳汁不通

漏蘆散 治婦人肥盛氣脈壅滯乳汁不通或經絡凝滯乳內脹痛或作癰腫將欲成者此藥服之自然內消乳汁通行

秘傳湧泉散 治乳婦氣脈壅塞乳汁不行及經絡凝滯或作癰腫

羅氏湧泉散 治滯氣 湧泉散 治乳汁不通不間虛盛先用梳刮乳房後服藥

產寶方 治產後 胡桃散 治婦人少乳及乳汁不行

早角散 治乳汁不通及乳結硬腫痛 張氏方 治益氣脈滯

雜方 計五首俱 下乳汁 加味四物湯 治氣血虛乳汁不通

玉露散 治產後乳脈不行身體壯熱疼痛頭目昏痛大便澀滯此藥涼膈壓熱不乳

當歸補血加葱白湯 治產後無乳 通脈散 治女人乳少

通乳湯 治乳後氣血不足經血衰弱乳汁澀少 一方 治乳汁不通

猪蹄湯 治婦氣少力衰脈澀不行絕乳汁 立效散 治下乳

又方 治乳汁少 鍾乳散 治乳婦氣少血衰脈澀不行乳汁絕少

雜方 計二首

乳汁自出

漏蘆散 見前

免懷湯 欲輸乳未通其月經則乳汁不行

一方 治婦人血氣方盛乳房作脹或無見食乳要消

吹乳癰腫

消毒飲 治吹乳乳癰井便毒如憎寒壯熱不痛

連翹飲子 治乳癰

一方 治血脈凝注不散結成吹乳乳癰痛腫不可忍

又方 治婦人乳中結核

內托升麻湯 治婦人兩乳間出黑頭瘡項陷不作黑眼並乳癰初起亦治

清肝解鬱湯 治肝經虛血風熱鬱火傷血結核為腫為潰

一方 治乳硬痛

金銀花散 治乳癰腫疼痛不可忍

丹溪方 治乳腫痛

一方 治乳癰始勞嗽腫

一方 治乳有核

復元通氣散 治婦人乳癰腫毒

治乳癰方

神效瓜蒌散 治婦人乳癰乳若神效

究明五物湯治乳癰已結未結痛

補遺方治吹乳結

究源五物湯 治乳癰直發散

橘香散 治乳癰已結未結痛極不可忍藥下神驗

一方 治乳癰

二灰散 治產後乳汁不泄結帶不消熱毒

獨勝散 治婦人吹妳初覺身熱頭疼寒熱及胸乳腫硬

又方 計三首

一方 治乳癰及無名腫熱

葱熨法 治吹乳乳癰

一方 治乳癰

維方 廿二首 治吹乳乳癰

乳妬

連翹湯 治產後妬乳并癰音皆下之

目錄

括葉散 治吹乳

補遺方 治吹乳結實腫痛

通和湯 治婦人乳癰疼痛不可忍

夜陰散 治吹乳乳癰

一方 治婦人吹乳頸腫身發熱增寒疼痛難忍不進飲食者

勝金丹 治吹乳結核不散腫神效

敷乳方

一方 治吹乳

柳根熨法 治乳癰二三百日衆療不痊但兼紫青色

瓜蒌散 治乳初結脹不消合敗乳自退

三

一方治姑乳

赤龍皮湯治姑乳

天麻湯治姑乳亦洗浸淫黃爛熱瘡

飛鳥散治乳頭生瘡及諸熱浸淫丈夫陰蝕瘡

黃連胡粉膏治乳瘡並諸濕

鹿角散治婦人乳頭生瘡汁

補遺方婦人乳頭小瘡爛瘡

乳巖

青皮散治乳巖初起如驚棋子不痛不十六味流氣散治乳

益氣養榮湯治抑鬱及勞傷血氣頸項兩乳或四肢腫

木香餅治一切氣滯結腫或痛或

乳懸

芎歸湯治產後瘀血上攻忽兩乳伸長細小如

濟陰綱目卷之一

關中 武之望叔卿父輯著 錢塘 張志聰隱菴父訂正

西陵 汪 淇 懔 漪 子 箋 釋 天都 查 望于周父叅閱

○調經

○論經主衝任二脉

任脈主任一身之陰血室太衝屬陽明為血之海故穀氣盛則血海滿而月事以時下天真天一也天一之氣升而為壬降而為癸壬陽而癸陰也三旬一見者為一小會之週天此其常也然有大

良方論曰岐伯云女子七歲腎氣盛齒更髮長二七而天癸至任脉通太衝脉盛月事以時下天謂天真之氣癸謂壬癸之水故云天癸也然衝為血海任主胞胎二脉流通經血漸盈應時而下常以三旬一見以象月盈則虧也若遇經行最宜謹慎否則與產後症相類若被驚恐勞役則血氣錯亂經脉不行多致勞瘵等疾若逆於頭面肢體之間則腫痛不寧若怒氣傷肝則頭暈脇痛嘔血

會中會之不
同故又有三
月一行一年

一行之變異

究其盈虧之

義則一也甚
有數年不行

而一行即受

娠者又超於

理之外宏豈

監化能為哉

胆氣化液而

生即水入于

經其血乃生

之意此榮出

中焦也故曰

生化之源心

統血者脾氣

化液入心而

變此為血也

癰癰癰若經血內滲則竅穴淋瀝無已凡此六淫外侵而變症百出犯時微若秋毫成患重於山岳可不畏哉

○論心脾為經血主統

薛立齋曰經云飲食入胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於

肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行東垣先生所謂脾為

生化之源心統諸經之血誠哉是言也心脾平和則經候如常苟

或七情內傷六淫外侵飲食失節起居失宜脾胃虛損心火妄動

則月經不調矣大抵血生於脾土故云脾統血凡血病當用苦甘

之藥以助陽氣而生陰血也

○論脾胃生血

薛立齋曰血者水穀之精氣也和調五臟灑陳六腑在男子則化

主亦難肝氣之所謂在婦人則上為乳下為經月事不調之類皆用苦辛散之藥飲

化源之心而詳立齋曰血者水穀之精氣也和調五臟麗陳六腑在男子則化

故雖心之所主亦藉肝氣

化生故不

不知

知水穀之精

氣是生血之

本則知脾胃

是生血之源

故脾胃不健

而血不生者

不可專主四

物矣

千金云婦人

經行如廁亦

有為風所客

者不可不知謹

經云三陽之

病發心脾男

子少精女子

為精在婦人則上為乳汁下為月水故雖心主血肝藏血亦皆統

攝於脾補脾和胃血自生矣凡經行之際禁用苦寒辛散之藥飲

食亦然

○論經不調由風邪客於胞中

陳氏曰婦人月水不調由風邪乘虛客於胞中而傷衝任之脉損

手太陽少陰之經蓋衝任之脉皆起於胞中為經絡之海與手太

陽小腸手少陰心經為表裏上為乳汁下為月水然月水乃經絡

之餘苟能調攝得宜則經應以時矣

○論三月一來為居經

脉經云師曰脉微血氣俱虛年少者亡血也乳子下利為可否者

此為居經三月一來曰寸口脉微而澀微則衛氣不足澀則血氣

各全綱目

卷一調經

二

婦科山房

不月此則又兼小腸而言

然小腸不過與心為合豈可混醒故當以素問為是

此言脈微氣血兩虛之居

經

此言寸脈微

瀉及胃脈浮

瀉陽不左陰

之居經

益女子尺脈

宜盛今反見

弱是榮不足

于下也寸口

衛脈浮大者

衛氣盛于上

無餘衛不足其息短其形躁血不足其形逆榮衛俱虛言語謬誤

跌陽脈浮而瀉瀉則衛氣虛虛則短氣咽燥而口苦胃氣澀則失

液少陰脈微而遲微則無精遲則陰中寒瀉則血不來此為居經

三月一來○問曰嬪人妊娠三月師脈之言此嬪人非軀今月經

當下其脈何類何以別之師曰寸口脈衛浮而大榮反而弱浮大

則氣強反弱則少血孤陽獨呼陰不能吸一氣不停衛降榮竭陰

為積寒陽為聚熱陽盛不潤經脈不足陰虛陽往一作實故令少血

時發酒漸咽燥汗出或溲稠數多唾涎沫此令重虛津液漏泄故

知非軀音煩滿血月稟一經三月一來陰盛則瀉名曰居經謂右

大左脈

反弱也

論師尼寡婦異乎妻妾之治

抑

盛地氣不足故曰支也舉寸以故知耳此言陽脉浮太陰脉反弱之居經此專主內經而言以相火寄于肝也男之慾皆從此出觀天地之氣始于春則知人欲之義必由于肝也烏歟孳尾亦然故治此者當以柴胡湯為法其如氣治法須隨證採後

羅謙甫曰宋褚澄療婦人寡婦別製方者蓋有謂也此二種寡居獨陰無陽慾心萌而多不遂是以陰陽交爭乍寒年熱全類溫瘧久則為勞嘗讀史記倉公傳載濟北王侍人韓女病腰背寒熱眾醫皆以為寒熱病倉公曰病得之欲男子不得也何以知診其脉肝脉弦出寸口是以知之蓋男子以精為主婦人以血為主男子精盛以思室女人血盛以懷胎也夫肝攝血者是厥陰肝脉弦出寸口上魚際則陰盛可知故知褚氏之言信有謂矣

○論調經當抑氣

濟生方論曰內經云百病皆生於氣經有所謂七氣有所謂九氣喜怒哀思悲恐驚者七氣也七情以外益心以寒熱二證而為九氣也氣之為病男子婦人皆有之惟婦人血氣為患尤甚蓋人身

方治之故此
不備列

矣

血隨氣行。氣一壅滯。則血與氣併。或月事不調。心腹作痛。或月事將行。預先作痛。或月事已行。淋瀝不斷。心腹作痛。或遵腰脇。或引背脊。上下攻刺。吐逆不食。甚則手足摘掇。狀類驚癇。或作寒熱。或為癥瘕。肌肉消瘦。非特不能受孕。久而不治。轉而為瘵疾者。多矣。

○論調經先去病

李氏曰。月水循環。織痼不作。而有子。若兼潮熱腹痛。重則加之咳。嗽汗嘔。或瀉。有潮汗。則血愈消耗。有咳嘔。則氣往上行。瀉則津偏於後。痛則積結於中。是以必先去病。而後可以滋血調經。就中潮熱疼痛。尤為婦女常病。蓋血滯積入骨髓。便為骨蒸。血滯積瘀於中。與日生新血相搏。則為疼痛。血枯不能滋養百骸。則蒸熱於外。血枯胞絡火盛。或挾痰氣食積寒冷。外邪則為疼痛。

析理無餘論
症極確鑿能
悉此何思不
良

○論調經大法

方氏曰婦人經病有月候不調者有月候不通者然不調不通之
中有兼疼痛者有兼發熱者此分而為四也然四者若細推之不
調之中有趲前者有退後者則趲前為熱退後為虛也不通之中
有血滯者有血枯者則血滯宜破血枯宜補也疼痛之中有常時
作痛者有經前經後作痛者則常時與經前為血積經後為血虛
也發熱之中有常時發熱者有經行發熱者則常時為血虛有積
經行為血虛有熱也此又分而為八焉大抵婦人經病內因憂思
忿怒外因飲冷形寒蓋人之氣血周流忽因憂思忿怒所觸則鬱
結不行人之經前產後忽遇飲冷形寒則惡露不盡此經候不調
不通作痛發熱之所由也大抵氣行血行氣止血止故治血病以

以類字推之
則所該者廣
幸母執也而
爲先爲佐尤
所當知

行氣爲先。香附之類是也。熱則流通。寒則凝結。故治血病以熱藥爲佐。肉桂之類是也。

○論經水異色

丹溪曰。經水者陰血也。陰必從陽。故其色紅。稟火色也。血爲氣之配。氣熱則熱。氣寒則寒。氣升則升。氣降則降。氣凝則凝。氣滯則滯。氣清則清。氣濁則濁。上應於月。其行有常。各之曰經。爲氣之配。因氣而行。成塊者。氣之凝也。將行而痛者。氣之滯也。來後作痛者。氣血俱虛也。色淡者。亦虛也。而有水濕之也。錯經妄行者。氣之亂也。紫者。氣之熱也。黑者。執之甚也。今人但見其紫者。黑者。作痛者。成塊者。率指爲風冷。而行溫熱之劑。則禍不旋踵矣。良由病源論月水諸病。皆曰風冷乘之。宜其相習而成俗也。或曰黑者。北方水色。

况元

明二公之說甚

麻証相參尤
篤的確

紅

也紫淡於黑非冷而何。予曰經云。元則害承乃制。熱甚者必兼水
化。所以熱則紫甚則黑也。塊婦人性熱而見鄙。嗜欲加倍。臟腑厥
陽之火無日不起。非熱而何。若曰風冷。必須外得。設或有之。益不
百兩一二也。

準繩云。冷症外邪初感入經必痛。或不痛者久則鬱而變熱矣。
且寒則凝。既行而紫黑。故非寒也。葉氏曰。血黑屬熱。丹溪之
論善矣。然風寒外乘者。十中常見一二。何以辨之。蓋寒主引澀。
小腹內必時常冷痛。經行之際。或手足厥冷。唇青面白。尺脉或
遲或微。或虛或雖大而必無力。熱則尺脉或洪或數。或實或雖
小而必有力。於此審之。可以得其情矣。

李氏曰。心主血。故以色經為正。雖不對期而色正者易調。其色紫

者風也。黑者熱甚也。淡白者虛也。或挾痰停水以混之也。如米泔水。如屋漏水。如豆汁。或帶黃。混濁模糊者。濕痰也。成塊作片。血不變者。氣滯也。或風冷乘之也。色變紫黑者。血熱也。大槩紫者。四物湯加防風。白芷。荆芥。黑者。四物湯加芩連。香附。淡白者。芎歸湯加參。芪。白芍。藥。香附。有痰者。二陳湯加芎歸。如烟塵者。二陳湯加秦。芫。防風。蒼米。如豆汁者。四物湯加芩連。成塊者。四物湯加香附。玄。胡。索。枳。殼。陳皮。隨症選用。

論經候愆期

王子亨曰。經者常候也。謂候其一身之陰陽愆伏。知其安危。故每月一至。太過不及。皆為不調。陽太過則先期而至。陰不及則後時而來。其有乍多乍少。斷絕不行。崩漏不止。皆由陰陽衰盛所致。

丹溪翁只主一執字而熱

症附又用蒼水南星等誰

其信之立齋

又分肝脾血

分勞役五種

尤為詳明

愚謂脾虛氣

鬱宜歸脾湯

脾胃氣鬱宜

越鞠丸之類

丹溪云經水不及期而來者血熱也四物湯加芩連香附○肥人

不及日數而多者痰多血虛有熱南星白朮蒼朮黃連香附川芎

作丸○薛氏曰先期而至有因脾經血燥者宜加味逍遙散○有

因脾經鬱滯者宜歸脾湯○有因肝經怒火者宜小柴胡湯加生

地黃○有因血分有熱者宜四物湯加柴胡牡丹皮山梔子○有

因勞役火動者宜補中益氣湯

丹溪云經力過期血少也用川芎當歸人參白朮兼痰藥治之○

過期色淡者痰多也二陳湯加芎歸○過期紫黑有塊血熱也必

作痛四物湯加香附黃連○薛氏曰過期而至有因脾經血虛者

宜人參養榮湯○有因肝經血少者宜六味地黃丸○有因體虛

血弱者宜八珍湯

黃芩藥者宜

無深意焉如
立齋養榮八
珍等湯但本
于此其用六
味丸者又為
補母之法宜
詳

○論月水多少

準繩云婦人病多是月經乍多乍少或前或後將發疼痛醫者不
審一例呼為經病不知陽勝陰陰勝陽所以服藥無効蓋陰氣乘
陽則包藏寒氣血不運行經所謂天寒地凍水凝成冰故令乍少
而在月後若陽氣乘陰則血流散溢經所謂天暑地熱經水沸溢
故令乍多而在月前當和血氣平陰陽斯為福也○陽勝陰月候
多者當歸飲陰勝陽月候少者七沸湯○又云經水過多為虛熱
為氣虛不能攝血○經水澀少為虛為澀虛則補之澀則濡之
脉經曰有一婦人來診言經水少不如前者何也師曰曾更下利
若汗出小便利者可何以故師曰亡其津液故令經水反少設經
下多於前者當所若困當言恐大便難身無復汗也

津液滑水穀
陰氣也亡之
則血失所養
矣故不如前
焉

茲與沉主氣
病
滑為實絕為
虛

○論月水不利

良方云婦人月水不利者由勞傷氣血體虛而風冷客於胞內傷於衝任之脉故也若寸脈弦關脉沉是肝病也兼主腹痛孔竅生瘡尺脉滑血氣實經絡不利或尺脉絕不至兼主小腹引腰氣攻胸膈也

薛氏曰前證屬肝膽二經蓋肝胆相為表裏多因恚怒所傷若本經風熱用補肝散方見脇痛門血虛用四物加酸棗仁若腎水不足用六味丸若患諸瘡瘍治見後

○論月水不斷

準繩云婦人月水不斷淋瀝無時或因勞損氣血而傷衝任或因經行而合陰陽皆令氣虛不能攝血若時止時行腹痛脉沉細此

不斷下血有
何分別臨症
宜細辨詳說

寒熱邪氣客於胞中。非因虛弱也。薛氏曰。前証若鬱結傷脾。用歸脾湯。悲怒傷肝。用逍遙散。肝火妄動。用加味四物湯。脾氣虛弱。用六君子湯。元氣下陷。用補中益氣湯。熱傷元氣。煎湯加五味麥門冬。炒黑黃蘗。

○論過期不止

產寶云。男子生於寅。寅屬木。陽中有陰。故男子得八數。女子生於申。申屬金。陰中有陽。故女子得七數。男以氣為主。八八則卦數已盡。女以血為主。七七則卦數已終。終則經水絕。衝任脈虛衰。天癸絕。地道不通。而無子矣。或勞傷過度。喜怒不時。經脈衰微之際。又為邪氣攻衝。所以當止不止而崩下也。許學士云。婦人經脈過期不止。腰腹疼痛。或七七數盡而月經下者。宜用當歸散治之。

據此宜用十全大補八珍湯入參養榮湯之類

○論經病疼痛

經水者。行血氣通陰陽以榮於身者也。氣血盛陰陽和則形體通。或外虧衛氣之充養。內乏榮血之灌漑。血氣不足。經候欲行。身體先痛也。此論身痛

良方云。婦人經來腹痛。由風冷客於胞絡。衝任或傷於太陽少陰

經。用溫經湯。桂枝桃仁湯。若憂思氣鬱而血滯。用桂枝桃仁生地

黃通經丸。方見經閉若血結而成塊。用萬病丸。

丹溪云。經水將來作痛者。血實也。一云氣滯。四物湯加桃仁香附

黃連。○臨行時腰疼腹痛。乃是鬱滯有瘀血。四物湯加紅花桃仁

義術玄胡索木香。有熱加黃芩柴胡。○經行後作痛者。血氣俱虛

也。以八珍湯加減服。○戴氏曰。經事來而腹痛者。經事不來而腹

有加香附青皮桃仁烏藥丹皮小茴五

靈脂者

思致工夫更
進一層

此全以脉爲
主不然亦非
此藥可全

亦痛者皆血之不調故也。欲調其血先調其氣。四物湯加吳茱萸
半錢。香附子一錢。和氣飲加吳茱萸半錢亦可。痛甚者玄胡索湯
然又恐感外邪傷飲食致痛。痛不因血尤宜詳審和氣飲却能兼
治。因冷而積因積而痛宜大溫經湯冷甚者去麥門冬不用。
汪石山治一婦人瘦小年二十餘經水紫色。或前或後臨行腹痛
惡寒喜熱。或時感寒腹亦作痛。脉皆細濡近滑。兩尺重按畧洪而
滑。此血熱也。或謂惡寒如此何謂爲熱。曰熱極似寒也。遂用酒煮
黃連四兩。香附歸身尾各二兩。五靈脂二兩爲末。粥丸。空腹吞之
而愈。

○一婦年二十一歲。六月經行腹痛如刮。難忍求死。脉得細軟而
駛。尺則沉弱而近駛。汪曰。細軟屬淫。數則爲熱。尺沉屬鬱滯也。以

往扇豈可不
盡則豈可
形經曰毋使
過之傷此是
也

黃連久服之
故

二句俱欠妥
惟陽寒有邪
故不為汗衰
者不治此惟
血脫陽無所
附故脉無力
不當言不為
血減
亦是寒涼太

酒煮黃連半觔炒香附六兩五靈脂半炒牛生三兩歸身尾二兩
為末粥丸空心湯下三四錢服至五六料越九年得一子後屢服
屢効歷十五年後前藥罔効汪復診之脉皆洪滑無力幸其尚有
精神汪曰此非舊日比矣舊乃鬱熱今則虛寒東垣曰始為熱中
終為寒中是也經曰脉至而從按之不鼓乃陰盛隔陽當作寒治
且始病時而形欬小今則形肥大矣書曰瘦人血熱肥人血虛豈
可同一治也所可慮者汗大泄而脉不為汗衰血大崩而脉不為
血減耳其痛曰重夜輕知由陽虛不能健運故亦凝滯而作痛以
證參脉宜用助陽若得脈減痛輕方為佳兆遂投參芪歸朮大劑
加桂附一貼來早再診脈皆稍寧服至三三十貼病且愈蓋病有
始終寒熱之異藥有前後用舍不同形有肥瘦壯少不等豈可以

過所謂以藥
醫藥可服此

混補之劑三
十貼愈

逍遙散為退
熱聖藥須善
加減

三方更妙

以病未深故
得效耳

一方而通治哉

○論經病發熱 附客熱

李氏曰潮熱有時為內傷為虛無時為外感為實虛者大溫經湯
熱者四物湯加柴胡黃芩經闕者滋血湯骨蒸者大胡連丸大烏
雞丸五心潮者四物湯加黃連胡黃連無汗者茯苓補心湯有汗
者逍遙散經前潮者血虛有滯逍遙散加牡丹皮桃仁玄胡索經
後潮者血虛有熱逍遙散去柴胡換地骨皮加生地黄此藥加減
為退熱聖藥尋常潮熱者腎氣丸大造丸或四物湯料加便炒黃
芩一兩四製香附一觔蜜丸服
○吳菱山治一婦經血過多五心煩熱日晡潮熱諸藥不效以四
物加胡黃連三服而愈

凡在倦怠及
兩月一度上
休以來

客邪而補中
益氣須細心
休認施用相
參必真虛者
方可不然恐
罹實實之害

薛新甫治一婦人經候過期發熱倦怠或用四物黃連之類反
兩月一度且少而成塊又用峻藥通之兩目如帛所蔽薛曰脾為
諸陰之首目為血脈之宗此脾傷五臟皆為失所不能歸於胃矣
遂用補中益氣濟生歸脾二湯專主脾胃年餘尋愈大全云客熱
者因體虛而將溫過度外熱加之非臟腑自生故云客熱其狀上
焦胸膈之間虛熱口燥心煩手足壯熱者是也

薛氏曰前證若客邪所侵補中益氣加川芎防風肝虛血少六味
地黃丸胃火飲冷錢氏瀉黃散胃虛飲湯七味白朮散潮熱時熱
八珍湯晡熱內熱逍遙散發熱體倦補中益氣湯悲怒發熱小柴
胡湯寅卯酉戌時熱升陽益陰湯

論往來寒熱

有熱入血室之象

諸症皆見在

少陽經用此

湯此經多氣

少血何為不

用當歸赤芍

生地

經水適來適斷或有往來寒熱者先服小柴胡以去其寒熱後以四物湯和之。薛新甫治一婦人耳內或耳後項側作痛寒熱口苦月經不調此肝火氣滯而血凝用小柴胡加山梔川芎丹皮治之諸病悉退。

大全云師尼寡婦與室女出嫁愆期者多因慾心萌而不遂慊慊

成病乍寒乍熱久則為勞又有經閉白淫痰逆頭風膈氣痞悶面

黧瘦瘡等證皆寡婦之病也。薛氏曰前證若肝脉弦出魚際用

小柴胡加生地黄送下生地黄丸久而血虛佐以四物湯。若兼

怒動肝火而寒熱者佐以加味逍遙散。一婦人因夫經商久不

歸發寒熱月經旬日方止服降火涼血藥反潮熱內熱自汗盜汗

月經頻數余曰經傷氣血虛也經頻肝脾虛也服歸脾湯六味丸

此倉公治欲男子不得之法也此婦通身慾火降之病血亦是正治大經寒涼望變又須治本也

月經頻數。余曰。經傷氣血虛也。經頻肝脾虛也。用歸脾湯。六味丸。

而愈。

論熱入血室。

邪入血分。故發狂者。且譫語。屬胃經者。多悲恐犯之。故云然。

良方云。婦久傷寒。傷風發熱。經水適來。晝則安靜。暮則譫語。有如瘧狀。此為熱入血室。治者無犯胃氣。及上二焦。宜服小柴胡湯。若脈遲身涼。當刺期門穴。下鍼病人五吸。停鍼良久。徐徐出鍼。凡鍼期門穴。必瀉。勿補。肥人二寸。瘦人寸半也。

凡遇此症。須當問此。

○許學士治一婦。病傷寒。發寒熱。遇夜則如見鬼狀。經六七日忽然昏塞。涎響如引鋸。牙關緊急。瞑目不知人。病勢危困。許視之曰。得病之初。曾值月經來否。其家云。經水方來。病作。而經遂止。得一二日發寒熱。晝雖靜。夜則有鬼祟。從曰。昨不省人事。許曰。此乃熱入血室證。仲景云。婦人中風發熱惡寒。經水適來。晝則明了。暮則

明知熱入血
室乃因症而
先治痰所謂
急則治標後
治其本也

使不能鍼或
用桃仁承氣
合小柴胡亦
可

讖語如見鬼狀發作有時此名熱入血室醫者不曉以剛劑與之
遂致胸膈不利涎潮土腕喘急息高昏冒不知人當先化其痰後
除其熱乃急以一呷散投之兩時頃涎下得睡省人事次投以小
柴胡湯加生地黃三服而熱除不汗而自解矣

一婦人患熱入血室證醫者不識用補血調氣藥治之數日遂
成血結胸或勸用前藥許公曰小柴胡已遲不可行也無已用期
門穴斯可矣予不能鍼請善鍼者治之如言而愈或問熱入血室
何爲而成結胸也許曰邪氣傳入經絡與正氣相搏上下流行遇
經水適來適斷邪愈乘虛入於血室血爲邪所迫上入肝經肝受
邪則讖語而見鬼復入膈中則血結於胸中矣何以言之婦人平
居水養木血養肝方未受孕則下行之爲月水既孕則中畜之以

凡診婦人先問經候有無此是關脈凡經行後似瘧譫語使是熱入血室

病根在腹急痛

養胎及已產則上壅之以爲乳皆血也。今邪逐血併歸於肝經聚於臆中結於乳下。故手觸之則痛非藥可及。故當刺期門也。

○虞恒德治一少婦。夏月行經得傷寒似瘧。譫語狂亂。諸醫皆以傷寒內熱投雙解散解毒湯服之大汗如雨。反如風狀。次以牛黃丸金石之藥愈投愈劇。一日延虞診視。脈弦而大。虞思傷寒內熱狂亂六陽俱病。豈不口乾舌黑。况脈不數。病體捫之或熱或靜。其腹急痛。意必有內傷在前。傷寒在後。今傷寒得汗雖已。內傷則尚存故也。因細問之。患者曰。正行經時。因飲食後多汗。用冷水抹身。因得此證。方知冷水外閉其汗。內阻其血。邪熱入室。經血未盡。血得邪熱。乍靜乍亂。寒熱譫語。掉眩。類風。須得玉燭散下之而愈。下後譫語已定。次以四物小柴胡湯調理五日。熱退身涼。患遂瘳。

以脉六七至。明知是熱。濇則知其爲有瘀血。寸大尺小。上焦有熱。此亦兼陽明胃府病。以頰赤口乾。不了而用姜桂。亦人所難。須慎之。

五味乾姜以治咳嗽。以未成痰故可加。

衍義云。一婦人溫病已十二日。論之其脉六七至而濇。寸稍大尺稍小。發寒熱。頰赤口乾。不了了耳聾。問之病數日經水乃行。此屬少陽。熱入血室也。若治不對病。則必死。乃按其證。與小柴胡湯服之。二日。又與小柴胡湯加官桂乾薑。一日寒熱遂止。又云。臍下急痛。又與抵當丸微利。臍下痛痊。身漸涼。脉漸勻。尚不了了。乃復與小柴胡湯。次日但胸中熱躁。口鼻乾。又少與調胃承氣湯。不得利。次日心下痛。又與大陷胸湯半服。利三行。次日虛煩不寧。時妄有所見。復狂言。雖知其尚有燥屎。以其極虛。不敢攻之。遂與竹葉湯去其煩熱。其夜大便自通。至晚兩次中有燥屎數枚。而狂言虛煩盡解。但咳嗽唾。此肺虛也。若不治。恐成肺痿。遂與小柴胡湯去人參大棗生薑加乾薑五味子湯。一日咳嗽減。二日而病悉愈。此皆用

等則誤矣

仲景方

以感冒故發散以譫語故清涼然云前症益甚而復用香砂歸脾人所難信其意重在嘔吐

薛立齋治一婦人懷抱素鬱感冒經行譫語服發散之劑不愈用寒涼降火前證益甚更加月經不止肚腹作痛嘔吐不食痰涎自出此脾胃虛寒用香砂六君子脾胃漸健諸證漸退又用歸脾湯而全愈

論經行泄瀉

當以脉証尋之者不可以是而造次也慎之

汪石山治一婦經行必瀉三日然後行診其脉皆濡弱此脾虛也脾屬血屬濕經水將動脾血先已流注血海然後下流為經脾血既虧則虛而不能運行其濕令作參苓白朮散每服一錢一日米飲調下二三次月餘經不瀉矣

○一婦年逾四十形長色脆病經不行右脉浮軟而大左脉虛軟

不運之說安

據脉帶語明是脾虛下陷豈得謂亡陰而補血乎大謬大謬

庶幾意當用補中益氣加續斷和仲扶

而小近駛常時經前作泄今年四月感風咳嗽用湯洗浴汗多因泄一月六月復因洗浴發瘧六七次瘧雖止而神思不爽至八月盡而經水過多白帶時下瀉泄覺有脚疼痛嘗曾閃脚脚跟今則假此延痛醫腿腰脇尻骨頸項右邊筋脉皆掣痛或咳嗽一聲則腰眼痛如腰札日輕夜重叫號不日幸痛稍止飲食如常今詳月水過多白帶時下日輕夜重瀉泄無時亦屬下多亡陰宜作血虛論治服四物止痛之劑益甚九月汪復診視始悟此病乃合仲景所謂陽生則陰長之法矣夫經水多白帶下常泄瀉皆由陽虛陷下而然命曰陽脫是也日輕夜重蓋日陽旺而得健運之職故血亦無疑滯之患而日故輕夜則陰旺而陽不得其任失其健運之常血亦隨滯故夜重遂以參朮助陽之藥煎服五七貼痛減此亦

滑為氣血有

脉法

冷

滑為氣血有餘故曰實

微弱為血不足浮弱亦然

○弦也沉也斷還也皆生

痛而不利而孔竅生瘡上

攻胸臆當別之

沉緊為寒在血分

此方加法便是四時妙理

倍當歸以迎春氣倍川芎

以迎夏氣倍

病證之變治法殊甚故記之

○脉法

脈經曰尺脉滑血氣實婦人經脉不利○少陰脉弱而微微則少

血○寸口脉浮而弱浮則為虛弱則無血○脉來至狀如琴弦苦

少腹痛主月水不利孔竅生瘡○肝脉沉主月水不利腰腹痛○

尺脉來而斷續者月水不利當患小腹引腰痛氣滯上攻胸臆也

○經不通繞臍寒疝痛其脈沉緊此由寒氣客於血室血凝不行

結積血為氣所衝血與故血相搏故痛

○調經通用諸方

四物湯 治婦人衝任虛損月水不調經病或前或後或多或少

或臍腹疔痛或腰足中痛或崩中漏下及胎前產後諸證常服

芍藥以迎秋
倍地黃以迎
冬用芍歸以
生一陽用芍
藥以生一陰
皆升降之行
也識之識之

益藥衛滋氣血若有他病隨證加減

當歸利血如血刺痛如
刀割非此不能除

川芎治風泄肝本如血虛
頭痛非此不能除

芍藥利血理脾如腹中虛
痛非此不能除酒炒

熟地黃補血如臍痛非此
不能除酒洗用

右劉各等分每服四錢水煎服春倍川芎夏倍芍藥秋倍地黃

冬倍當歸夫春生夏長秋收冬藏者四時生物之功也物順四時

物湯者豈無精意於其間哉如常歸之甘辛溫潤可喻春日之和

融川芎之辛溫而散可喻夏令之敷榮此生長之用也有生長而

不為收藏則何以成物故用白芍之酸收以成秋熟地之味厚以

成冬此又收藏之妙矣然四時之中以甘為土德之用故歸地之

甘以和之此又五行之不離乎土也昔海藏云如用血藥當於四

物湯中擇其一二可也又豈無意哉故如行血則用芍歸以行春

夏之令如欲止血則用地芍以行秋冬之令此又升沉之道也觀
佛手散犀角地黃湯止用四物中之二物蓋可想矣雖然物自物

夏之令如欲止血則用此藥以行和氣之令止又于此時也
佛手散犀角地黃湯止用四物中之二物蓋可想矣雖然物自物
矣物其物者苟無主宰於其間則物無物矣
即四物奚為哉故元神胃氣尤為喫緊者也

若春則防風四物加防風倍川芎

若夏則黃芩四物加黃芩倍芍藥

若秋則門冬四物加天門冬倍地黃

若冬則桂枝四物加桂枝倍當歸

若血虛而腹痛微汗而惡風四物加茂桂謂之腹痛六合

若風眩暈加秦芫羌活謂之風六合

若氣虛弱起則無力疋然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合氣不足而用泄

氣之藥加平當以參芪易之

若發熱而煩不能睡卧者加黃連梔子謂之熱六合

若虛寒脉微自汗當兼氣藥氣難布息清便自調加乾薑附子謂之寒六合

若中濕身沉重無力身涼微汗加白朮煑薑謂之濕六合

若婦人筋骨肢節疼及頭痛脉弦憎寒如瘧宜治風六合四物湯

加羌活防風

若血氣上衝心腹脇下滿悶宜治氣六合四物加木香檳榔

若臍下虛冷腹痛及腰脊間悶痛宜立胡六合四物加玄胡索苦

練

若氣衝經脉月事頻併臍下多痛宜倍芍藥加黃芪

虛者宜此

若經事欲行臍腹絞痛臨經痛者血澀也加玄胡苦練鮮少木香

檳榔

若婦人血虛果凝之故腹痛不可忍妙者去地黃加乾薑好名四神湯

補下元更有妙着加乾薑甘草

氣築小腹痛加立索

再開動

氣築小腹痛。加立索。

再斟酌

若腹中刺痛惡物不下。倍加當歸芍藥。

若腹痛作聲。經脈不快。以血虛寒故。加熟地黃一倍。添桂心半倍。

經行腹痛腰背痛。加薑薑平膝。紅花。吳茱萸。菴蘭。甘草。水宜。銀器燈心。

熱服。

若經水澀少。加葵花煎。又加紅花。血見愁。

若經水少而色和者。倍加熟地黃。當歸。宜審慎

若經水暴下。加黃芩。若腹痛加黃連。如夏月。不去黃芩。

若經水如黑豆汁者。加黃芩。黃連。

經水過多。別無餘證。宜黃芩六合湯。四物湯。黃芩。白朮等分。亦好

經血淋漓不斷。加乾薑。蓮房炒。入藥。凡造藥宜焦黑

交合經行法

須識表證更有次序可法

以虛冷而崩中故加艾令人不問冷熱而皆用膠艾殊可笑也

陰陽交合經脉行加赤石脂黃芪肉桂百草霜藕節敗櫻灰肉豆蔻當歸木香龍骨白茯苓白朮地榆

若經水適來適斷或有寒熱往來者先服小柴胡湯以去其寒熱後以四物湯和之如寒熱不退勿服四物是謂變證表邪猶在不能效也依前論中變證隨證用藥調治

若血崩者加生地黃蒲黃

補血佳崩加百草霜櫻灰首縣灰蒲黃炒過龍骨白薑

血成片加地黃藕節血黑片加人參白朮

若血臙虛冷崩中去血過多加阿膠艾

月水不調血崩或多或少或前後嘔逆心膨加陳艾黃芪心膨宜審

若赤白帶下宜香桂六合四物湯加桂枝香附各減半

婦人白帶良驗如白淫濁加龍骨地黃當歸如漏下五色研鹿麝香

若赤白帶下宜香桂六合四物湯加桂枝香附各減半

此皆古法宜
本說的確方
可遵之

以經閉而用
利水之藥何
也豈非以下
焦氣滯而道
之耶

四物湯爲細末蜜煉丸梧子大空心米飲湯下三四十九治高年
婦人白帶良驗如白淫濁加龍骨地黃當歸如漏下五色研麝香
好酒下如鮮紅溫酒鹽湯下如帶下加肉桂蒲黃百草霜甘草黑
豆白朮玄胡索白薑龍骨空心鹽酒下如白帶加白龍骨酒下
若婦人血積者加廣茂京三稜桂乾漆炒烟盡各等分
若經血凝滯腹內血氣作疼加廣茂官桂等分玉石膚云熟地黃
滯血安能止痛不若以五靈脂代之

血滯不通加桃仁紅花

經閉加枳殼大黃荊芥黃芩青皮滑石木通瞿麥海金沙山梔子

車前子

血寒用此未善

血寒加甘草烏梅柴胡柳枝

野苧入湯藥

月經久閉。加肉桂甘草黃芪薑黃棗子木通紅花。

月水不通。加野苧根牛膝紅花蘇木舊酒水同煎。血氣不調。加吳

茱萸等分。甘草減半。

諸虛不足。加香附子。

四物湯加甘草半兩。為細末。煉蜜丸。每兩作八九。酒醋共半盞煎。

湯同化調下。名當歸煎。去敗血。生好血。如人行五里。再進一服。無

時。

若虛熱病。四物湯與參蘇飲相合。名補心湯。主之。添柴胡名五神

湯。大能補虛退虛熱。

潮熱。加黃芩地骨皮柴胡。一方加柴胡乾葛黃芩人參。

虛熱口乾。加麥門冬黃芩。

以甘能和。惟氣不足者。宜之。如要調氣。宜倍香附。最妙。

虛而多汗。加煨牡蠣。麻黃根。各減半。

虛熱口乾。加麥門冬、黃芩。

虛渴。加人參、乾葛、烏梅、桔梗、黃根。

虛而多汗。加煨牡蠣、麻黃根。各減半。

虛寒潮熱。加柴胡、地骨皮、白朮、茯苓、甘草、秦艽、知母、黃芩、麥芽、貝

母、人參、烏梅、棗子。

與蒼朮、熟地、配

若四肢腫痛。不能舉動。宜以蒼朮各半湯主之。

意見自超然。必有濕意。且

若大便秘結。四物湯與調胃承氣湯各半。名玉燭散主之。

若流溼潤燥。宜四物理中各半湯。

若氣血俱虛。四物與四君子湯各半。名八珍湯主之。加縮砂、仁、保

胎氣。令人有子。有熱加黃芩。

若謂熱生風。常清熱。溫不

若因熱生風者。加川芎、柴胡、防風。

清熱而散鬱。熱當以意逆

血氣勞。加荊芥、柴胡。非治勞。乃行肝膽之氣。血結滯生熱也。與用青蒿同。

之

乃治痺痿妙藥

下三節俱治血風而交証不同用藥亦異自當心悟

以嘔吐嘔逆而所加藥固是矣然與物同用然乎否乎古人治欬多用參五味然審察虛實

血風兩脇築痛或盤腸成塊加大黃草撥乳香

宜考症

考藥

血弱生風四肢痺疼行步艱難加人參乳香沒藥麝香甘草五靈

脂羌獨活防風荆芥地龍南星附子澤蘭為末蜜丸木瓜鹽湯下

血風膨脹加甘草木香枳殼馬兜鈴葶藶紫蘇藿香地黃空心服

臍臍秘加大黃桃仁

滑泄加官桂附子以四物治瀉人所未信學者當知

嘔加白木人參一方有生薑

嘔吐不止加霍香白木減半人參再減半

脾胃虛寒所至

嘔逆飲食不入加白木丁香甘草人參宿砂益智仁胡椒

若欬嗽加桑白皮半夏人參生薑北五味子甘草

有至仁須審之

若發寒熱加乾生薑牡丹皮柴胡

若平喘此少壯虛乾皮體虛瘦也言不通只用生薑薄荷此是婦人

用參五味
若發寒熱
加乾生薑
牡丹皮此未明

不可誤信也

逍遙散以薄荷
引即是
此意

槐花桂心也
槐與一半以
治吐衄今人
難知古法多

若寒熱往來加炮乾薑牡丹皮各二分

以專須通姜辛內以薄荷散濟于外

若平常些少虛脫肢體瘦倦月信不通只用生薑薄荷此是婦人

常服之藥蓋味寡而性緩効遲而功深

若大渴加知母石膏

若水停心下微吐逆者加猪苓茯苓防已

若心腹脹滿加枳殼青皮

虛汗引回陷陰加麻黃根

汗多缺氣養心加浮麥

腸風下血加槐角槐花枳殼荆芥黃芩大腹皮紅內消地梅石楠

藤白鷄冠花為散煎一半為末空心鹽湯舊酒調下新酒有毒故用陳者

鼻衄吐血加竹青蒲黃藕節半夏丁香訶子桂花紅棗飛羅麵白

用亦須識之
以脩泰考

茅根蚌粉

宜蜜

若頭昏項強似三字不可必加人參黃苓

若虛寒似傷寒者加人參柴胡防風

若虛煩不得睡加竹葉人參

此以四肢腫痛用蒼朮此以諸痛有濕

若諸痛有濕者四物與白朮相半加天麻妙茯苓妙穿山甲用酒煎服

用白朮相半

治老人風秘通經要藥加青皮等分

宜思之

老人風秘加青皮人所本

治瘡疾加荆芥酒煎常服

用知產後亦有

奶癰加連翹茨菰子紅內消白芷查菰片荆芥牛膝山蜈蚣乳香沒

藥漏蘆生地黃

赤眼頭風疾加薄荷清茶

赤眼生風即此小加防風黃苓

脚腫加大腹皮赤小豆茯苓皮土薑皮

赤眼生風加防風黃芩

風瘡赤腫加荆芥牛蒡子何首烏甘草防風羌活地黃鹽酒

脚腫加大腹皮赤小豆茯苓皮生薑皮

若婦人傷寒汗下後飲食減少血虛者加黃芪白朮茯苓甘草宜

傷寒有六經八物湯

以自汗合桂枝湯也

若妊娠傷寒中風表虛自汗頭痛項強身熱惡寒脉浮而弱太陽經病宜表虛六合湯四物湯四雨桂枝地骨皮各七錢

以無汗合麻黃加細辛合少陰

若妊娠傷寒頭痛身熱無汗脉浮緊太陽經病宜表實六合四物湯四雨麻黃細辛各半雨

若妊娠傷寒中風濕之氣脉節煩疼脉浮而熱頭痛此太陽標病

也宜風濕六合湯四物湯四雨防風蒼朮各七錢

合升麻湯

若妊娠傷寒下後過經不愈溫毒發斑如錦紋宜升麻六合四物

湯四柴胡黃芩各七錢

若妊娠傷寒胸脇滿痛脈弦少陽頭昏項強宜柴胡六合四物湯

合小柴胡四柴胡黃芩各七錢

若妊娠傷寒大便鞭小便赤氣滿而脈沉數陽明太陽本病也急

下之宜大黃六合四物湯四大黃半兩桃仁十箇去皮

若妊娠傷寒汗下後咳嗽不止宜人參六合四物湯四人參五味

子各半兩

若妊娠傷寒汗下後虛痞脹滿者陽明本虛也宜厚朴六合亦治

欬嗽喘滿四物湯四厚朴枳實各半兩

若妊娠傷寒汗下後不得眠者宜梔子六合四物湯四梔子黃芩

各半兩

字

在汗下後三

古難之此重

人參五味今

以咳嗽而用

合桃仁承氣

合白虎湯

湯四石膏知母各半

合四苓

瀉各半

非仲景法

若妊娠傷寒太陽本病小便赤如血狀者宜琥珀六合四物湯四

仲景無此法

阿膠艾各半兩一方加乾姜甘草黃芪

此仲景法

若妊娠傷寒四肢拘急身涼微汗腹中痛脈沉而遲少陰病也宜附子六合四物湯四附子炮去桂各半

所語有故無殞也

若妊娠傷寒畜血證不宜墮胎藥下之宜四物大黃湯四物湯四

生地黃大黃

酒浸各半兩

四物與麻黃桂枝白虎柴胡理中四逆茱萸承氣涼膈等皆可作各半湯不能殫述此易老用藥大略也

安胎及漏下血加阿膠大艾甘草蒲黃炒過

以胎漏而加乾姜何也

若胎動不安下血不止每服加艾葉五七片更加葱白阿膠末黃耆減四味之半當歸只用小半如疾勢甚者以四味各半兩細剉以水四盞熟艾六塊如鷄子大阿膠五七片煎至二盞半去滓分作四服一日令盡一方加粉草乾姜黃芪日二三服至二臘

為臘

加阿膠艾葉水煎服名六物湯胎前產後每日可一二服亦治血痢不止腹痛難忍

者少而胎動

少或赤或白非時漏下多服有效受胎小腸氣痛加水香懷香

痢不止腹痛難忍

婦人小腸氣者少而胎前尤為望見宜識之備驗

衝肝一症尤所未聞諸藥皆涼血去風熱亦瀉肝氣也

作惡生寒面青皆脾胃不足尤宜血之以損孕為虛宜大補以下血為熱宜黃

一方加黃芪、栢葉、阿膠、甘草、續斷、治平常經血淋漓不斷或多或少或赤或白非時漏下多服有效受胎小腸氣痛加水香、懷香、胎前嗽加枳殼、甘草、欬冬、馬兜鈴、半夏、通葶、蔞人、參、桔、梗、麥門冬。

胎氣衝肝腰脚痺行步艱難加枳殼、木通、連翹、荆芥、地黃、羌獨山梔、甘草、燈心、空心服。

妊娠心煩加竹茹一塊。

如有敗血則用當歸、近上、節、易白芍藥以赤熟地黃以生。

妊娠作惡生寒面青不思飲食憔悴加陳皮、枳殼、白朮、茯苓、甘草、損孕下血不止頭痛寒熱耳鳴氣血勞傷所致加黃芩、荆芥、生地。

黃赤芍藥生姜。

芩須斟酌也

臨產小腹緊痛加紅花滑石甘草燈心葵子

產後惡露腹痛不止加桃仁蘇木牛膝

血塊攻痛失笑散妙

產後腹痛血塊攻腸加大艾沒藥好酒

若因產後欲推陳致新補血海治諸疾加生姜煎

不知古法而欲治今病真如瞽者夜行路矣嗟嗟

若產後被驚氣滯種種積滯敗血一月內惡物微少敗血作病或

如瞽者夜行路矣嗟嗟

脹或疼胸膈痞悶或發寒熱四肢疼痛加玄胡沒藥香白芷與四

物等分爲細末淡醋湯或用童便酒調下

妙在掛芥

如血風於產後乘虛發作或產後傷風頭疼發熱百骨節痛每四

不羔之加非

物湯兩加荆芥穗天麻香附子石菖蒲香各一錢五分每服三錢水一

可

盞煎至七分服

用石膏不可輕

產後傷風頭痛加石膏等分甘草半

易合用也

是大法也宜
熟

若產後虛勞日久而脉浮疾者宜柴胡四物湯乃本方與小柴胡湯合用也。

若產後諸症各隨六經以四物與仲景藥各半服之甚效。

產後虛憊發熱煩悶加生地黃。

產後腹脹加枳殼肉桂。

產後寒熱往來加柴胡麥門冬。

產後敗血築心加地骨皮芍藥。地骨皮恐未善

產後潮熱加白朮北柴胡甘草牡丹皮地骨皮。

產後病眼加北細辛羌活荆芥菊花甘草木賊石決明草決明。

產後浮腫氣急腹脹喉中水雞聲加牡丹皮荆芥白朮桑白皮赤

小豆大腹皮杏仁半夏馬兜鈴生薑葱白薄荷。

如有風熱可
加無則不可

失音須明虛實。恐太弱也。悶亂須問胎血有無。骨何風而用龍骨。何也。諸熱藥亦未善。

此方不用地黃而補肝脾。清金制水。又是四物湯之一。皮用以此。推之。應矣。無窮矣。

產後失音不語。加訶子。人參。沙蜜。百藥煎。

產後悶亂。加茯神。遠志。

胎前產後痢後風。加乳香。龍骨。茱萸。木香。肉桂。蒼朮。牡丹皮。白薇。

人參。甘草。澤蘭。大椒。懷香。煉蜜為丸。木瓜酒下。

簡易當歸散。治經脈不勻。或三四月不行。或一月再至。或腰腿

疼痛。不依時而行。

當歸 川芎 白芍藥 炒 黃芩 炒 各一兩 白朮 炒 各一兩

山茱萸肉 各一兩半

有為細末。空心溫酒調下。三錢。日三服。或判每服七錢。加生

薑水煎服。如冷去黃芩。加肉桂。一方有熟地黃。

增損四物湯。治月事不調。心腹疼痛。補血溫經駐顏。

增損四物湯 治月事不調 心腹疼痛 補血溫經駐顏

當歸

川芎

芍藥

熟地黃

白木

牡丹皮

錢各一

地骨皮

一錢

又一錢也白木難溫而丹皮地骨却清肌骨之藥故溫字恐誤

右咬咀作一服用水二鍾煎至一鍾食前服

大溫經湯

治衝任虛損月候不調或來多不已或過期不行或

既曰溫經何為又治諸熱証也請細詳之不如無書蓋有諸矣

崩中去血過多或損娠瘀血停留小腹急痛五心煩熱並者治

之此溫劑內冷者宜之

當歸

去蘆

川芎

人參

阿膠

碎炒

肉桂

去麁皮

白芍藥

炒

吳茱萸

湯

牡丹皮

甘草

炒各二錢

麥門冬

去心

二錢半

半夏

生薑湯

泡七

次二錢半

右剉作一服加生薑五片水煎食前稍熱服

嚴氏抑氣散

治婦人氣盛於血變生諸證頭暈胸滿

此飲翁先生

齊金匱

卷二調經通用諸方

二四

交感丹法也
氣真之餘方
可用

配四物更佳
有熱者須加
條芩

絕妙好方

前方以黃和

香附子四兩

陳皮二兩

茯苓去木

甘草

右爲末每服二錢食前沸湯調下

四製香附子

治婦人女子經候不調

香附子

擦去皮二斤分作四分好酒浸一分鹽水浸一分童便浸一分醋浸一分各三日焙乾

右爲細末醋糊丸如桐子大每服七十丸空心食前鹽酒下附香

子血中之氣藥也開鬱行氣而血自調何病不瘳婦人宜常服之

十味香附丸

治婦人經候不調

香附

四製一斤當歸

川芎

白芍藥

炒

熟地黃

各四兩

白朮

澤蘭葉

陳皮

各二兩

黃柏

鹽水炒

甘草

炙各一兩

右爲末醋糊丸如梧桐子大每服七十丸空心鹽湯下

九味香附丸

治婦人百病皆宜

前方以黃和九味香附丸治婦人百病皆宜

而涼下此以
尚香而溫下
白木又倍于
前別是一種
意見不可說
有

芍藥是煖子
宮溫下元之
品今人不分
寒熱而驟用
之何哉

前方有玄胡
索此方有阿
膠則艾多此

香附子

童便浸一宿再用
醋煮晒乾炒四兩
當歸酒洗

川芎

酒洗
芍藥炒

生地黄

酒洗

陳皮

去白各
一兩

白朮

酒二兩

黃芩

酒炒一兩二錢

小茴香

炒五錢

右為末醋糊丸如桐子大空心酒下八九十丸熱加地骨皮軟

柴胡酒浸各一兩

艾附煖宮丸

治婦人經水不調小腹時痛赤白帶下子宮寒冷

香附

四製一斤

艾葉

醋浸炒四兩

當歸

川芎

白芍藥

酒炒

生地黄

薑汁炒各一兩

玄胡索

炒二兩

甘草

生用八錢

為細末醋糊丸如桐子大每服七八十丸米湯酒任下

百子歸附丸

調經養血安胎順氣胎前產後及月事參差有餘

不足諸證悉治久服有孕

艾少。有行之妙。陳石榴酸。澁。當是固經之意。

稟弱者。先天之氣弱也。血生于氣口。生于下。故用熟地為君。人參佐之。以生下焦之氣。使陰氣旺而生血也。臣以烏梅。以生液而斂血入肝。夫既生矣。斂矣。而不為流行之。則血凝。血不通。故以芎歸為使。其或於

香附四製十兩 阿膠碎炒 艾葉 當歸酒洗 川芎

芍藥炒 熟地黄酒洗各二兩

右為末。用陳石榴一枚。連皮搗碎。煎水打糊。丸如桐子大。每服百丸。空心淡醋湯下。

人參養血丸。治女人稟受素弱。血氣虛損。當服補衝任調經候。暖下元。生血氣。

熟地黄五兩 烏梅肉三兩 當歸二兩 人參 川芎

赤芍藥 蒲黃炒各一兩

右為細末。煉蜜丸如梧子大。每服八十丸。溫酒米飲任下。當歸地黃丸。治婦人血氣不和。月事不勻。腰腿疼痛。

當歸 川芎 白芍藥 熟地黄各半兩 牡丹皮

之其或遺也 立前齊錢半人參 黃黃一分半 食前米飲下

也。以赤芍破之。其或遺也。以炒蒲黃。瀉之。庶乎生而不塞。止而不寒。降中有升。溫之不熱。細玩銖遺之多寡。便知立方之妙用。此方妙在分兩之減半。雖謂血生於氣。旺生火。故不多焉。稽目總方。四物湯以下諸丸方。左出各。有次序。各具妙理。誠為學。

立胡索

各二錢半

人參

黃芪

各一錢二分半

右為末。煉蜜丸。如梧子大。每服三十丸。食前米飲下。

○治經候先期

先期湯

治經水先期而來。宜涼血固經。

當歸

白芍藥

炒

生地黃

各二錢

黃檗

炒

知母

炒各一錢

條芩

炒

黃連

炒

川芎

阿膠

炒各

艾葉

八分

香附子

甘草

炙各七分

右作一服。水二鍾煎一鍾。食前溫服。

金匱土瓜根散

治帶下。經水不利。小腹滿痛。經一月再見者。

土瓜根

芍藥

桂枝

麝蟲

各七錢

右四味搗為散。酒服方寸匕。日三服。

者津梁病人
砭石調劑者

之法也

先期血熱也

艾葉乃溫下

元之藥非先

期所宜而少

加於寒涼之

中者即復其

之義亦有不

必用者在自

酌之

此方補血行

血溫氣破氣

故為氣寒氣

滯者所宜而

脾虛不能生

血以致過期

者無與也

此八珍湯之

○治經候過期

只此二方猶為未盡

過期飲 治經水過期不行乃血虛氣滯之故法當補血行氣

當歸

白芍藥

熟地黃

香附錢各二

川芎

錢一

紅花

分七

桃仁泥

分六

蓬莪朮

木通

分各五

甘草

炙各四分

肉桂

分四

右作一服水二鍾煎一鍾食前溫服

滋血湯 治婦人心肺虛損血脉虛弱月水過期

人參

黃芪

山藥

錢各一

白茯苓

去皮

川芎

白芍藥

熟地黃

錢各一

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

○治經水過多

○治經水過多

變如脾肺元氣不足者尤宜

久不止而熱者固宜矣若脾氣下陷血不歸經者不宜如此加法

自古調經每多用之所以暖下元也如下元虛而此方氣降者治之無熱者當不必也

此方不用一

當歸飲即苓朮四物湯

抑陽助陰調理經脈若月水過多別無餘證

當歸酒炒川芎

白芍藥

熟地黃酒蒸

白米

黃芩

右劉水煎服○如久不止成血崩者加阿膠炒山梔子炒地榆

荆芥甘草或再不止更加搗茅根汁磨墨同服

膠艾湯治勞傷氣血衝任虛損月水過多淋瀝不止及妊娠調

攝失宜胎氣不安或因損動下血並治

熟地黃

白芍藥各一錢

當歸

艾葉各七分

分半

阿膠

少成珠

川芎

甘草

炙各五分

右劉水煎服

一方加地榆黃芪

丹溪方治婦人稟受弱氣不足攝血故經水來多

卷二

婦人調經通用者方

三

榮

來血藥學者
要知此意

本方以血藥
治行期以氣
藥治腹痛重
在腹痛上妙
在等分不然
後三味何以
用也

此方全在血
分藥花須用
紅者乃潤燥
之藥

濟陰附目

卷一

白朮一錢半 黃芪生 陳皮各一錢 人參五分 甘草炙二分
右剉水煎服

治經水澀少

七沸湯。治藥衛虛經水愆期或多或少腹痛。一云陰勝陽月候

少者用此

當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 蓬朮

川薑 木香 各等分

右每服四錢。水一盞半。煎至八分。溫服。

四物加葵花湯。治經水澀少。

當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 葵花各二錢

一方又加紅花血見愁。

妙在色和一二四勿見易中此也去青當歸是。台至水少而色和。

之藥 一方又加紅花血見秘

妙在色和二
字尤妙在加
後二物

右判水煎服

四物湯加熟地黃當歸湯 治經水少而色和

四物湯四雨 再加熟地黃 當歸各一兩

右每服一兩水煎服

○治月水不利

牛膝散 治月水不利 臍腹作痛 或小腹引腰氣攻胸膈

牛膝酒洗一兩 桂心 赤芍藥 桃仁去皮尖 玄胡索炒

當歸酒浸 木香 牡丹皮各七錢半

右為細末 每服三錢 空心溫酒調下 或五六錢水煎亦可

牡丹散 治月候不利 腹臍疼痛不欲食

牡丹皮 大黃炒各一兩 赤茯苓 桃仁 當歸

此證重在疼
痛不重在不
欲食如白米
用治不食則

或可而痛則不可
大黃地黃痛則可用
而不食不可用
處方者須得其本

此方只重不相
二字與恍惚驚悸絕無
相干若因不利而致者則可

生地黃

桂心

赤芍藥

白朮

各七錢半
石韋去毛

木香

各五錢

右以咀每服三錢水一盞生薑三片煎七分空心溫服

養榮湯 治婦人血海虛弱心中恍惚時多驚悸或發虛熱經候

不利

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃

青橘皮

薑黃

川薑

五加皮

牡丹皮

海桐皮

白芷

各等分

右剉每服五錢水一盞半生薑五片烏梅一箇煎至一盞溫服

不拘時

玄歸散

治月經壅滯臍腹滿痛

玄歸散 治月經壅滯 臍腹滿痛

當歸

玄胡索 各等分

右為粗末。每服三錢。加生薑三片。水煎稍熱服。

歸漆丸 治月經不利。臍下慙逆。氣腹滿。

當歸 四錢

乾漆 三錢 炒 令烟盡

右為細末。煉蜜丸如桐子大。每服十五丸。溫酒下。

○治月水不斷

止經湯 治婦人困倦多睡。少食。經水時時淋瀝。或成片。或下赤

白黃水。面色青黃。頭眩目花。四肢酸疼。此證急宜調理。免致崩

漏。

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃 各一錢 白朮

黃芩

阿膠 炒

蒲黃 炒

栢葉 各七錢 香附 一錢

據此證俱屬脾胃元氣不足。當用人參養榮歸脾補中十全之類。而此亦穩當。如加參芪更佳。

簡當妙在等分

砂仁

甘草 各五分

右作一服。加生薑三片。水煎空心服。

蒲黃散。治血經不止。

黃芩

五分 當歸

栢葉

蒲黃 各四分 生薑 二分

芡葉

一分

生地黄

二十四分

伏龍肝

十二分

石叻咀。用水二升煎取八合。分二服。

固經丸。

治經水過多不止。乃陰虛挾熱所致。法當補陰清熱。

黃蘗

白芍藥

各三兩

黃芩

二兩

龜板

炙四兩

檳榔皮

香附子

童便製各一兩半

右為細末。酒糊丸。桐子大。每五七十九丸。白湯下。

○治過期不止

此方以生地為主。而芡葉止用一分。又無補氣之藥。讀者要知此意。

此丹溪先生法也。以肝腎之陰為主。四物中止用一物。豈尋常所知。

此方以生地為主。而芡葉止用一分。又無補氣之藥。讀者要知此意。

○山過期不止

芩心丸。治婦人四十九歲已後。天癸當住。每月却行。或過多。不

止。

用米泔入陽明經胃氣也

黃芩

心枝條二兩。米泔浸七日。炙乾。又浸。又炙。如此七次。

右為末。醋糊丸。如桐子大。每服七十丸。空心溫酒下。日進二服。

補中莒藹湯

治風虛冷熱。勞傷衝任。月水不調。崩中暴下。產後

失血過多。虛羸腹痛。或妊娠胎動下血。

當歸

乾薑

炮各三兩。川芎

蜜炙。熟地黃

黃芪

人參

杜仲

炒

吳茱萸

炮

甘草

炙各一兩

每服三錢。水一鍾半。煎至一鍾。空心服。

茸附湯

補衝任。調血氣。

正流之藥。不難於澀。而難於虛熱。尤妙。

乾薑

鹿茸

酒炙

當歸

牡蠣

煨各附子

齊會圖目

卷一調經通用諸方

三十

於補血中之
氣舉下陷之
用

此身痛故其
立法如此要
知身痛腹痛
自是不同

右每服半兩。水二鍾煎八分。溫服。
右二方寒者宜之。蓋亦有血海虛寒而不禁者。

○治經病疼痛

越痛散。治血氣虛寒。身體作痛。

虎骨錢五

當歸

芍藥

白朮

茯苓

甘草

續斷

防風

白芷

藁本

附子各三錢

右為粗末。每服五錢。水二鍾。生薑五片。棗三枚。煎至一盞。不拘
時服。此治身痛之劑。

八物湯。治經事將行。臍腹絞痛者。氣滯血澀故也。

一八物湯 治經事將行 臍腹絞痛者 氣滯血凝故也

前四味是血 後四味是氣 而川芎血中 有氣立胡氣 中有血不可 不知

此方又有破 血破氣也 行氣藥也 將來作痛者可 服

此方治氣多

當歸 川芎 芍藥 熟地黄 玄胡索

苦練 碎炒各一錢 木香 檳榔 各五分

右作一服 水煎食前服

加味四物湯 治經水將來作疼不止

當歸 酒洗 川芎 各一錢 芍藥 少 熟地黄 玄胡索

蓬朮 醋煮 香附 醋煮各一錢 砂仁 八分 桃仁 去皮尖 七分

紅花 酒炒 五分

右剉水煎服

烏藥湯 治血海疼痛

烏藥 一錢 香附 二錢 當歸 一錢 木香 甘草 炙各五分

右剉水煎服

此全是氣其
惟血實者宜
之妙在不用
血藥

妙在用醋以
人有行氣也

此與加味四
物小異其妙

加味烏藥湯 治婦人經水欲來。臍腹疴痛。

烏藥

縮砂

木香

玄胡索

各一兩

香附

炒去毛
二兩

甘草

炙一兩半

右細剉。每服七錢。生薑三片。水煎溫服。

澹寮煮附丸 治經候不調。血氣刺痛。腹脇膨脹。頭暈。惡心並

宜服之。

香附子

擦去毛。不拘多少。米醋浸一日。用瓦銚煮令醋盡。

右爲末。醋糊丸如桐子大。晒乾。每服五十丸。淡醋湯下。

已上三方。行滯氣之劑。

薑黃散 治血藏久冷。月水不調。及瘀血凝滯。臍腹刺痛。

薑黃

白芍藥

炒三兩

當歸

牡丹皮

玄胡索

各二兩

川芎

蓬朮

官桂

細花

又在土地黃而加官桂黃

別方琥珀散有琥珀本方却又無之亦贊其功而借名耳此神品藥也而本事方之加減更精

用烏藥玄胡最當

川芎

蓬朮

煨切

官桂

紅花

各兩

右剉每服一兩水二盞酒少許同煎食前服

琥珀散

治婦人月經壅滯每發心腹臍疔痛不可忍及治產後

惡露不快血上搶心迷悶不省氣絕欲死者

京三稜

蓬朮

赤芍藥

劉寄奴

牡丹皮

熟地黃

真蒲黃

炒

當歸

官桂

菊花

各一兩

右前五味用烏豆一升生薑半斤切片米醋四升同煮至豆爛

為度焙乾入後五味同為細末每服二錢溫酒調下空心食前

服○本事云一方不用菊花蒲黃用烏藥玄胡索亦佳予家之

秘方也若是尋常血氣痛只一服產後血衝心二服便下常服

用乳沒以通
氣血之滯亦
莫進一步法
也

若論小便刺
痛當用牛膝
陳皮此用似
般何也所宜
確之

尤佳。予前後救人急切不少。亦宜多合以濟人。

玄胡索散。治血氣攻刺疼痛。及新舊虛實腹痛。

當歸

酒浸

赤芍藥

炒

玄胡索

蒲黃

隔紙炒

桂皮

乳香

木切

沒藥

各一錢

右為細末。每服三錢。溫酒空心服。

當歸散。治婦人久積血氣。疔痛。小便刺痛。四肢無力。

當歸

赤芍藥

酒少

劉寄奴

枳殼

熱炒

玄胡索

沒藥

各等分

右為末。熱酒調下二錢。不拘時服。

經驗方。治婦人臍腹疼痛。不省人事。只一服立止。人不知者云。

是心氣痛誤矣。

然必用之以

木通

芍藥

五靈脂等分

是心氣痛誤矣

功在五臟然必用之以醋若水通芍藥一通一斂皆有妙用

相交為用補不足也

木通去皮

芍藥炒

五靈脂炒各等分

右咬咀每服五錢醋水各半盞煎七分溫服

三神丸治室女血氣相搏腹中刺痛引心䟽經行澀少或經

事不調以致疼痛

橘紅二兩

玄胡索去皮

當歸酒浸畧炒各一兩

右為細末酒煮米糊為丸如梧桐子大每服七十丸加至百丸

空心艾湯送下米飲亦可

交加散治婦人榮衛不通經脈不調腹中撮痛氣多血少結聚

為瘕及產後中風

生地黃

生薑各五兩各研取汁

右交互取汁浸沽一夕汁盡為度各炒黃末之尋常腹痛酒調

此方與琥珀散不相上下而此有白芍似可

下三錢產後尤不可缺

交加散。治榮衛不和。月事湛濁。逐散惡血。治臍腹撮痛。腰腿重

墜。

生薑

二斤搗取汁存滓用

生地黄

二斤搗取汁存滓用

白芍藥

當歸

玄胡索

醋紙包煨熱用布擦去皮

蒲黃

隔紙炒各一斤

桂心

一兩

紅花

炒無惡血不用

沒藥

另研各半兩

右將地黃汁炒生薑滓。生薑汁炒地黄滓。各焙乾。同諸藥為細末。

每服三錢。溫酒調下。若月經不依常。蘇木煎酒調下。若

腰痛。糖球子煎酒調下。

交加地黄丸。治婦人經不調。血塊脹痞。肚腹疼。

生地黄

老生薑

各一斤俱另搗取汁存滓

玄胡索

一方而有三變矣。此又變

藥肉桂為一

當歸

川芎

芍藥

明乳香

變矣此又變
生地黄 老生薑 各一斤 俱另
立胡索

而為九而沒
藥肉桂為一
家比以三友
人參桃仁為
一家亦不甚
相遠問古人
方須得古人
變法乃妙

丹溪治血塊
多用瓦楞子
古方治而塊
多用薑桂熱
藥而此用大
黃寒藥宜寒
宜熱者別
之

當歸

川芎

芍藥

明乳香

木香各雨

桃仁去皮尖

人參各半雨

香附半斤

右為末。先以生薑汁浸地黄滓。以地黄汁浸生薑滓。晒乾。皆以汁盡為度。其十一味合一處。晒乾。研為末。醋糊為丸。空心薑湯下。五七十丸。

瓦龍丸 治瘀血作痛

香附

醋煮四雨

當歸

牡丹

桃仁去皮尖

大黃蒸各二雨

川芎

紅花各半雨

瓦龍子

煨醋煮一晝夜二雨

右為末。炊餅丸。空心溫酒下。三四丸。

已上諸方。行瘀血之劑。

桂枝桃仁湯。治經候前。偶感風寒。腹痛不可忍。

即桂枝湯法
也芍藥用赤
者妙

要貼先字
縮字用藥亦
奇

溫在冷痛

桂枝

芍藥

生地黄

各二錢

桃仁

去皮尖
七錢

甘草

炙各
一錢

右為粗末。生薑三片。棗一枚。水煎溫服。

婦人冬月經行。偶值
歸寧途中傷冷。遂經止

不行。腹痛不可忍。用此藥一
劑而痛止。經復行。効効如神。

柴胡丁香湯

治婦人年三十歲。臨經預先腰臍痛。甚則腹中亦

痛。經縮二三日。

柴胡

半錢

羌活

當歸

各錢

生地黄

一分

丁香

四分

全蝎

洗二箇

右剉作一服。水四盞。煎至一盞。去渣。稍熱食前服。

小溫經湯。治經候不調。臟腑冷痛。

當歸

附子

炮各等分

右以咀。每服三錢。水煎。空心服。

當歸

附子 炮各半

右以咀每服三錢水煎空心服

沒藥除痛散 逐寒和療腹痛

蓬朮煨一兩 當歸 玄胡索 五靈脂

肉桂去粗皮 良薑炒 蒲黃炒 甘草炙

沒藥各半兩

右為末每服五錢溫酒服

已上諸方祛風冷之劑

○治經病發熱

逍遙散 治血虛煩熱口燥咽乾減食嗜臥月水不調又主榮衛

不和痰嗽潮熱肢體羸瘦漸成骨蒸

當歸酒洗 白芍炒 白朮 白茯苓

此方重在脾胃及行肝膽

良薑是脾寒藥肉桂是溫經藥

鬱滯故不用
生地

陽勝則熱如
肝陰不足而
肝火獨甚者
宜之脾胃壯
者可加胡荽
連

柴胡

錢各一

甘草

分炙五

右加生薑三片麥門冬二十粒去心水煎服不拘時○一方加

牡丹皮梔子炒名加味逍遙散○一方加知母地骨皮○有嗽

加桑白皮貝母桔梗知母麥冬○咳血加生地黃山梔牡丹皮

○嘔吐加陳皮半夏旋覆花○嘈襍加薑炒黃連或芩連二陳

湯

加味四物湯

治衝任虛損月水不行肌膚發熱如勞瘵狀

當歸

川芎

白芍藥

生地黃

各一兩

柴胡

兩半

黃芩

二錢半

右吹咀每服八錢水煎服○如骨蒸四物湯加地骨皮牡丹皮

○一方四物湯加朝黃連極効

三和分有法... 治血虛氣不足... 體煩熱四肢倦怠不進飲食

○一方四物湯加朝生與連極効

此治血虛而氣分有虛熱者

六神湯 治血氣不足身體煩熱四肢倦怠不進飲食

當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 黃芪

地骨皮 各一錢

二方氣血不同學者自當分別

右咬咀水煎空心服

○治往來寒熱

陽虛則惡寒陰虛則發熱此方氣血並補與十全大補湯同乃獨無人參而柴胡阿膠是所經中藥亦治寒熱之要訣也

本事方 治婦人血脈不調往來寒熱狀如勞倦

當歸 川芎 黃芪 甘草 官桂 各一兩

熟地黃 白芍藥 白米 各二兩 柴胡 阿膠 碎炒各半兩

右為細末每服五錢棗一枚水煎空心服白湯點服亦得當永

不生帶下調血脈養子宮終身無病

地骨皮散 治血風氣虛時作寒熱或晡熱內熱

按黃芪人參

桂心是補肺
 溫氣藥桑皮
 枳殼地骨皮
 是補肺清熱
 藥白芍茯苓
 是降收之味
 五加前胡是
 行散之味而
 乃並用之重
 在氣虛有火
 當以分兩中
 求之疾若中
 審之則竅妙
 自得參芪白
 朮益肺脾三
 焦元氣而治
 不欲食麥冬
 生地清心與
 包絡中火而
 生血並治口

地骨皮

柴胡各一兩

桑白皮炒

枳殼麩炒

前胡

黃芪炒各七錢五分

人參

白茯苓

白芍藥

甘草

五加皮

桂心各半兩

右咬咀每服三五錢水一盞半生薑三片煎七分服

柴胡散

治婦人寒熱體瘦肢節疼痛口乾心煩不欲飲食

北柴胡

赤茯苓

黃芪

白朮各一錢

麥門冬

去心三錢龍甲醋炙二錢

人參

地骨皮

枳殼

麩炒

生地黃

桑白皮

赤芍藥

桔梗

甘草

各五分

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

七寶湯

治寒熱往來

防風 玉桂 知母

生地黃 雨

柴胡 玉桂

七寶湯 治寒熱往來

乾心煩柴胡
龍甲解骨節

中熱而外散
赤茯苓導

心火散血熱
而下行枳桔

地骨桑皮瀉
肺火散結氣

干胸中亦補
中有瀉之方

也要知不用
芍歸之旨乃

妙邪在表而
寒者宜防風

邪在表而熱
者宜知母胸中

經絡結宜
寒裏陰陽不

分之寒熱甘
草人參益氣
以防解散之

防風去蘆 知母 生地黃各半 柴胡去蘆

前胡去蘆 秦艽 甘草各二錢半

右咬咀每服五錢水一盞半加人參三分煎七分服

柴胡四物湯 治婦人日久虛勞微有寒熱此四物湯與小柴胡

湯合方也 日微有寒熱則似病未甚

當歸 川芎 芍藥 熟地黃各一兩半

柴胡八錢 人參 黃芩 半夏

甘草各三錢

右剉每服一兩生薑三片水煎

柴胡抑肝散 治寡居獨陰無陽慾心萌而多不遂是以惡寒發

瘧證

虞生地涼心
以為陽氣
守是方以
結而氣血未
虛者宜之
此方疎肝開
鬱散結氣結
血涼心啟脾
自是一種心
此乃越鞠丸
之套方也分
兩妙
此方感當歸
為厥陰肝經
鬱火結血之
劑
按此乃治太
陽傳經病益
藏血適來則
血室虛邪乘

柴胡二錢
青皮二錢
赤芍藥炒
牡丹皮各一錢半

蒼朮米泔炒
山梔子炒
地骨皮
香附子各一錢

神麵八分
川芎七分
生地黃
連翹各五分

甘草二分

右剉一服水煎空心臨卧服

生地黃丸 治師尼寡婦寒熱如瘧欲男子不得者

生地黃二兩
赤芍藥一兩
柴胡
黃芩
秦艽各五錢

右為末煉蜜丸如桐子大每服三十丸煎烏梅湯吞下日三服

○治熱入血室

小柴胡加地黃湯 治婦人中風發熱惡寒經水適來晝則明爽

夜則譫語如見鬼狀發作有時此名熱入血室亦治產後惡露

來忽然斷絕

虛入而為越經
症然血室與胃
肝有氣血之分
故謬語有晝
之別目如見鬼
者以肝臟邪客
而魂不安本神
自病也用小柴
胡以解表裏之
邪用生地黃以
涼血中之熱故
有不愈則又有
期門之刺矣其
加桃仁紅花及
承氣抵當等湯
者因其微甚
而瀉之也同一
熱入血室寒熱
也而此不用煎
方反用薑桂牡

來忽然斷絕

柴胡 三錢

半夏

黃芩 各二錢
人參 一錢半

甘草 五分

生地黃 一錢半

右作一服水二鍾生薑五片棗二枚煎一鍾不拘時服

四物湯用生地黃加柴胡煎服亦可

乾薑柴胡湯 治婦人傷寒經脈方來熱入血室寒熱如瘧或狂

言見鬼

柴胡 一錢

桂枝 三分

括蕞根 五分

牡蠣 炒

乾薑 炮

甘草 炒各三分

右水煎服汗出而愈

牛黃膏 治熱入血室發狂不認人者

蠟何歟又與柴

胡桂薑湯不相

上下此但少知

母黃參耳可見

古方增減一味

自有脈絡不可

輕視然其發要

在如瘧并汗出

而愈毒何便

知與前方不同

真活法也可發

人之智慧此

真是心經藥要

知子母相傳之

理此非執入血

室證乃是血結

胸膈方今集入

此者要以肝胆

脅循喉嚨也鍼

法俱錄於後

牛黃 二錢半

硃砂

鬱金

牡丹皮 各三錢

腦子

甘草 各一錢

右為細末煉蜜丸如桐子大每服一丸新水化下

海蛤散 治婦人傷寒血結胸膈宜服此藥及鍼期門穴

海蛤

滑石 煅水

甘草 各五錢

芒硝 一兩

右為末每服二錢用鷄子清調下小腸通利其結血自散更用桂枝紅花湯發其汗則愈

重訂濟陰綱目卷之一終

可
夢